



Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance

Résultats de l'enquête auprès des client-e-s 2006

Recueil de tableaux statistiques

Mariana Astudillo, Etienne Maffli

Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du monitoring *act-info*. Nous remercions également les collaborateurs et collaboratrices des services de consultation qui ont effectué les tâches de logistique et de saisie. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance et coordonne l'ensemble du réseau *act-info*. Un grand merci également à Edith Bacher et Christiane Gmel pour la conception graphique et la mise en page de ce rapport ainsi qu'à Marina Delgrande Jordan pour sa précieuse collaboration dans le développement des syntaxes d'analyse.

Compléments d'information: Etienne Maffli, tél. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
e-mail emmaffli@sfa-ispa.ch

Réalisation: Mariana Astudillo & Etienne Maffli, Institut suisse de
prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA)

Diffusion: Librairie ISPA, case postale 870, 1001 Lausanne,
tél. 021/321 29 35, fax 021 321 29 40,
e-mail librairie@sfa-ispa.ch

Prix: Fr. 10.–

Langue du texte original: français

Graphisme/mise en page: ISPA

Copyright: © ISPA-SFA Lausanne 2008

Citation recommandée: Astudillo, M & Maffli, E. (2008). Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance: résultats de l'enquête auprès des client-e-s 2006 – Recueil de tableaux statistiques. Lausanne: Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies.

Table des matières

act-info – Information network an addiction care and therapy in Switzerland

act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance

ADMISSION

- T1 Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2006)
- T2 État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2006)
- T3 Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2006)
- T4 Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2006)
- T5 Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2006)
- T6 Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2006)
- T7 Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2006)
- T8 Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2006)
- T9 Instance d'envoi principale et secondaire, selon le problème principal et chez les proches (2006)
- T10 Type d'aide attendue à l'admission et statut légal de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2006)
- T11 Traitements/prises en charge avant l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2006)
- T12 Substitution et autre traitement/prise en charge à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2006)
- T13a Admission suite à une cure de sevrage, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2006)
- T13b Fréquence des sevrages sans aide professionnelle avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2006)
- T14 Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2006)
- T15.1a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2006), hommes

-
- T15.1b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2006), hommes
- T15.2a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2006), femmes
- T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2006), femmes
- T15.3a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2006), hommes & femmes
- T15.3b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2006), hommes & femmes
- T16.1a Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2006), hommes
- T16.1b Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2006), femmes
- T16.1c Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2006), hommes & femmes
- T16.2a Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2006), hommes
- T16.2b Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2006), femmes
- T16.2c Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2006), hommes & femmes
- T17 Mode d'administration de la principale substance posant problème au cours des 6 derniers mois avant l'admission (2006)
- T18 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 6 derniers mois avant l'admission des injections, échange de matériel d'injection au cours des 6 derniers mois avant l'admission et âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2006)
- T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2006), hommes
- T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2006), femmes
- T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2006), hommes & femmes
- T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2006), hommes
- T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2006), femmes
- T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2006), hommes & femmes

-
- T20 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2006)
 - T21 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2006)
 - T22a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2006), hommes
 - T22b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2006), femmes
 - T22c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2006), hommes & femmes

SORTIE

- T23 Sexe et âge, selon le problème principal et chez les proches (2006)
- T24 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2006)
- T25 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2006)
- T26 Plus haute formation achevée, source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2006)
- T27 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2006)
- T28a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2006)
- T28b Destination des transferts, selon le problème principal et chez les proches (2006)
- T28c Cause de décès, selon le problème principal et chez les proches (2006)
- T29 Durée de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2006)
- T30 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2006)
- T31 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2006)
- T32 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2006)
- T33 Fréquence des rechutes, substance ou comportement impliqué et durée des rechutes pendant la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2006)
- T34 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2006)
- T35 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème (seulement patient-e-s) (2006)

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Le Réseau de monitoring de la prise en charge et du traitement des dépendances en Suisse (*act-info*) réunit sous le même toit les cinq statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse, à savoir:

- SAMBAD (Statistique du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance)
- Residalc (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse)
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie)
- HegeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne)
- Méthadone (Statistique nationale des traitements de substitution)

Ces cinq statistiques disposent depuis 2004 d'instruments harmonisés et optimisés. Les données communes sont intégrées dans une base de données centralisée, permettant ainsi de procéder à des analyses sur l'ensemble des secteurs. Avec l'adoption des standards européens (Treatment Demand Indicator), la comparabilité des données au plan international est également garantie.

act-info est financé et coordonné par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la réalisation des relevés effectués dans les différents domaines de traitement est confiée à l'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Berne (ISPM), l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies à Lausanne (ISPA) et l'Institut de recherche sur les addictions et la santé à Zürich (ISGF).

act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance (SAMBAD)

Dès 2004, les instruments de monitoring *act-info* ont été introduits dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance et remplacent les anciens questionnaires en vigueur depuis 1994. Seuls quelques services isolés ont encore utilisé les anciens instruments pour le relevé de 2006. La réalisation d'*act-info* dans ce secteur est confiée à l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA).

La statistique *act-info* SAMBAD offre un aperçu de la clientèle et des activités de l'aide ambulatoire en matière de dépendance en Suisse. Les données sont récoltées au début et à la fin de la prise en charge. Les informations rassemblées à l'admission renseignent en particulier sur les caractéristiques socio-démographiques des client-e-s, sur leurs expériences de traitement ainsi que sur leurs modes de consommation et problèmes psychosociaux avant la prise en charge. Les informations récoltées à la sortie rendent principalement compte des caractéristiques socio-démographiques des client-e-s à ce moment, des mesures prises par les intervenant-e-s durant la prise en charge et des circonstances de la fin de celle-ci.

En 2006, 68 des 223 institutions recensées dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance ont participé au monitoring *act-info*. Il s'agit de services de consultation spécialisés pour les problèmes liés à l'alcool et/ou aux drogues illégales ainsi que de divers types de services polyvalents offrant également une aide pour les problèmes addictifs.

Quelques explications concernant les tableaux

La présente statistique descriptive des données de l'enquête *act-info* auprès des client-e-s du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance repose sur deux types de tableaux:

- lorsque la question a des catégories de réponses prédéfinies ou recodées en tranches distinctes (par exemple "état civil" ou "âge"), le tableau indique les pourcentages des différentes catégories de réponses
- lorsque la question n'a pas de catégories prédéfinies, mais requiert une valeur numérique (par exemple "âge au début de la consommation problématique"), le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1er quartile, 3e quartile)

La plupart des tableaux présentent les résultats de façon distincte pour les sous-groupes de patients et patientes ayant mentionné l'**alcool**, un **opiacé** (héroïne notamment), la **cocaïne** (et dérivés) ou le **cannabis** comme problème principal au moment de leur admission. Les **proches** venant consulter pour les problèmes d'un tiers font également l'objet d'analyses séparées pour les aspects socio-démographiques. A l'exception des thèmes directement liés aux modes de consommation ou aux formes de comportements addictifs non liés aux substances, les résultats ne sont en revanche pas présentés séparément pour les client-e-s (peu nombreux) ayant mentionné d'autres substances (par exemple un stimulant ou les substances volatiles) ou un problème addictif non lié à une substance (par exemple jeu pathologique) comme problème principal. Ces personnes sont cependant incluses dans les analyses portant sur l'ensemble des prises en charge figurant dans les blocs à droite des tableaux respectifs. Toutes les analyses sont effectuées séparément pour les hommes et pour les femmes ainsi que pour tous sexes confondus (colonnes "Total" comprenant également les quelques personnes dont le sexe n'est pas connu).

Seules les réponses valides sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Le nombre de réponses valides **N** représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages ou autres paramètres. Il est indiqué pour chaque groupe ou sous-groupe considéré. Au dessous, le nombre correspondant de données manquantes figure également. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés particulièrement prudemment.

Des notes en bas de tableau renseignent sur les éventuelles particularités des groupes de référence ainsi que sur le type de question. Lorsque plusieurs réponses sont possibles (par exemple aux tableaux du thème T19, "autres problèmes addictifs") les pourcentages obtenus ne sont pas additifs.

T1 Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2006)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Sexe*																			
hommes			71.6			77.4			75.8			81.4			26.7			64.7	4'009
femmes			28.4			22.6			24.2			18.6			73.1			35.2	2'183
sexe pas connu			0.0			0.0			0.0			0.0			0.2			0.0	2
N**	2'301	913	3'214	485	142	627	232	74	306	490	112	602	288	787	1'077	4'009	2'183	6'194	6'194
Age (en années)*																			
jusqu'à 14	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	5.5	4.4	4.0	0.9	1.7	0.9	1.0	1.0	58
15-19	1.8	1.5	1.8	3.1	12.9	5.3	7.0	23.3	10.9	53.2	56.4	53.8	16.8	4.5	7.7	10.1	7.8	9.3	564
20-24	4.4	2.4	3.9	14.7	22.1	16.4	22.2	30.1	24.1	20.1	20.0	20.1	9.1	5.5	6.5	9.3	7.7	8.7	532
25-29	6.2	4.6	5.8	18.7	11.4	17.0	20.9	19.2	20.5	9.7	5.5	8.9	5.1	5.5	5.4	9.1	6.6	8.2	501
30-34	10.0	9.0	9.7	22.4	15.0	20.7	18.3	4.1	14.9	5.5	5.5	5.5	4.0	10.4	8.7	11.3	9.4	10.7	651
35-39	12.7	9.5	11.8	23.3	22.1	23.0	17.0	17.8	17.2	4.3	1.8	3.9	8.4	12.5	11.4	13.2	11.4	12.6	766
40-44	16.9	16.8	16.9	10.7	12.9	11.2	10.0	4.1	8.6	1.6	4.5	2.2	10.9	13.4	12.8	13.3	13.6	13.4	818
45-49	14.8	18.7	15.9	5.2	2.9	4.7	3.5	1.4	3.0	0.8	0.0	0.7	14.2	17.1	16.3	10.9	14.8	12.2	746
50-54	13.4	15.4	13.9	1.5	0.7	1.3	1.3	0.0	1.0	0.6	0.9	0.7	8.0	10.8	10.0	8.9	10.8	9.6	583
55-59	9.6	9.5	9.5	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	8.1	7.1	5.9	7.3	6.4	392
60-64	5.9	6.9	6.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	5.3	5.0	3.9	5.0	4.3	261
65-69	2.4	4.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.3	3.5	1.7	3.0	2.1	131
70-74	1.3	0.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	1.8	2.2	1.0	1.0	1.0	61
75 et plus	0.4	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.9	1.5	0.5	0.6	0.5	33
N**	2'281	905	3'186	477	140	617	230	73	303	487	110	597	274	761	1'036	3'956	2'140	6'097	6'097
données manquantes	20	8	28	8	2	10	2	1	3	3	2	5	14	26	41	53	43	97	97
Age (valeurs centrales)																			
moyenne	44.3	48.3	45.5	33.0	30.9	32.5	30.7	26.5	29.7	21.6	20.9	21.4	39.7	43.3	42.4	38.6	42.2	39.9	
écart-type	12.1	66.2	36.8	7.8	8.8	8.1	8.0	8.2	8.3	7.2	7.4	7.2	18.1	13.7	15.0	14.0	44.8	28.9	
1er quartile	36.2	38.9	36.7	27.0	22.4	26.0	24.2	20.7	23.2	16.8	16.4	16.8	22.3	34.0	32.2	27.7	31.0	28.6	
valeur médiane	44.2	46.2	45.0	33.2	31.3	32.9	29.8	24.6	28.3	18.1	17.7	18.0	41.4	43.7	43.2	38.5	42.2	39.8	
3e quartile	52.6	53.9	53.0	38.0	38.2	38.0	36.1	32.8	36.0	24.0	23.0	23.9	51.8	52.0	51.9	48.2	51.1	49.5	
N**	2'281	905	3'186	477	140	617	230	73	303	487	110	597	274	761	1'036	3'956	2'140	6'097	6'097
données manquantes	20	8	28	8	2	10	2	1	3	3	2	5	14	26	41	53	43	97	97

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T2 État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2006)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Etat civil*																			
célibataire	37.7	28.8	35.1	74.0	70.5	73.2	73.1	77.8	74.2	92.6	93.1	92.7	45.5	23.2	28.9	52.4	36.2	46.6	2'669
marié-e	34.6	31.0	33.6	14.1	9.1	13.0	16.3	9.7	14.7	5.1	4.0	4.9	43.2	58.1	54.2	27.7	37.2	31.1	1'779
séparé-e	5.8	6.0	5.9	2.4	3.0	2.5	3.5	2.8	3.3	0.9	1.0	0.9	4.9	4.4	4.6	4.5	4.8	4.6	265
divorcé-e	19.5	28.8	22.2	8.0	13.6	9.3	6.2	9.7	7.0	1.2	2.0	1.3	6.1	11.7	10.2	13.7	18.2	15.3	876
veuf/veuve	2.2	5.3	3.1	0.4	1.5	0.7	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	1.5	1.4	3.0	2.0	114
partenariat enregistré	0.1	0.1	0.1	1.1	2.3	1.3	0.4	0.0	0.3	0.2	0.0	0.2	0.0	0.8	0.6	0.3	0.6	0.4	22
N**	2'108	845	2'953	462	132	594	227	72	299	433	101	534	264	754	1'020	3'685	2'038	5'725	5'725
données manquantes	193	68	261	23	10	33	5	2	7	57	11	68	24	33	57	324	145	469	469
Nationalité*																			
CH	79.2	88.9	82.0	65.9	85.8	70.5	73.5	74.2	73.7	89.1	84.5	88.2	78.7	81.8	80.8	77.9	84.8	80.3	4'597
EU	12.7	8.3	11.4	19.5	9.7	17.2	16.0	18.2	16.5	4.6	6.8	5.0	10.3	9.8	9.9	12.6	9.3	11.4	655
autre	8.0	2.8	6.5	14.6	4.5	12.3	10.5	7.6	9.8	6.3	8.7	6.8	11.0	8.4	9.2	9.5	5.9	8.2	470
N**	2'079	856	2'935	452	134	586	219	66	285	457	103	560	263	753	1'018	3'666	2'054	5'722	5'722
données manquantes	222	57	279	33	8	41	13	8	21	33	9	42	25	34	59	343	129	472	472

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T3 Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2006)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Degré d'urbanisation*																			
grands centres urbains	10.4	12.6	11.0	0.3	0.8	0.4	1.1	1.6	1.2	0.2	0.0	0.2	9.2	12.1	11.4	6.8	9.9	7.9	424
périphérie des grands centres	10.4	14.9	11.7	1.0	2.4	1.4	2.2	1.6	2.0	2.8	2.1	2.7	12.9	11.8	12.1	7.8	11.1	8.9	479
villes de moyenne importance	17.2	19.0	17.7	27.8	32.0	28.8	29.6	29.0	29.4	23.9	39.4	26.7	12.0	18.8	17.0	20.0	21.7	20.6	1103
petites villes	33.1	27.6	31.6	43.6	43.2	43.5	33.9	37.1	34.7	32.2	28.7	31.5	34.9	29.3	30.8	35.0	30.1	33.2	1778
campagne	28.9	25.9	28.0	27.3	21.6	25.9	33.3	30.6	32.7	40.9	29.8	38.9	30.9	28.0	28.8	30.4	27.2	29.3	1568
N**	2'007	807	2'814	392	125	517	186	62	248	423	94	517	249	693	942	3'443	1'909	5'352	5'352
données manquantes	294	106	400	93	17	110	46	12	58	67	18	85	39	94	135	566	274	842	842
Type de ménage (30 derniers jours)*																			
seul-e en ménage	39.9	34.2	38.3	36.0	29.6	34.6	31.9	26.7	30.7	15.9	15.9	15.9	14.0	9.8	10.9	33.6	23.4	30.0	1388
avec un ou les parents	7.7	3.7	6.6	15.2	15.7	15.3	22.4	23.3	22.6	58.6	51.1	57.2	23.1	6.1	10.1	17.8	9.9	15.0	694
avec enfant(s), sans partenaire	1.9	13.7	5.3	1.5	9.6	3.3	0.5	3.3	1.1	0.5	6.8	1.7	2.7	11.8	9.6	1.6	11.7	5.2	239
avec partenaire, sans enfant	22.5	26.6	23.7	13.7	18.3	14.7	15.2	18.3	15.9	7.6	8.0	7.6	19.4	25.5	23.9	18.3	23.8	20.2	936
avec partenaire et enfant(s)	19.6	13.9	18.0	11.0	7.8	10.3	11.9	5.0	10.4	3.9	3.4	3.8	36.0	44.5	42.5	17.1	23.6	19.4	899
avec d'autres proches	1.2	1.1	1.1	2.5	6.1	3.3	7.6	6.7	7.4	4.7	1.1	4.0	0.0	0.5	0.4	2.3	1.4	2.0	91
avec des amis (colocation)	1.9	2.0	1.9	5.9	3.5	5.4	5.7	6.7	5.9	1.8	2.3	1.9	2.2	1.0	1.3	2.7	2.0	2.5	115
autre	5.3	4.9	5.2	14.2	9.6	13.2	4.8	10.0	5.9	7.0	11.4	7.8	2.7	0.8	1.3	6.5	4.1	5.7	262
N**	1'642	657	2'299	408	115	523	210	60	270	384	88	472	186	593	781	2'992	1'630	4'624	4'624
données manquantes	659	256	915	77	27	104	22	14	36	106	24	130	102	194	296	1017	553	1570	1570
Situation de domicile (30 dernier jours)*																			
domicile fixe	94.4	93.7	94.2	83.3	80.5	82.6	90.0	78.1	87.2	93.6	87.1	92.4	94.8	97.6	96.9	92.6	93.2	92.8	4388
sans domicile fixe	3.5	3.9	3.6	9.6	12.7	10.3	7.2	12.5	8.4	3.5	7.1	4.1	4.7	2.1	2.7	4.6	4.6	4.6	218
institution	2.0	2.4	2.1	7.1	6.8	7.1	2.9	9.4	4.4	2.9	5.9	3.5	0.5	0.3	0.4	2.8	2.2	2.6	123
N**	1'722	664	2'386	406	118	524	209	64	273	374	85	459	191	614	807	3'062	1'665	4'729	4'729
données manquantes	579	249	828	79	24	103	23	10	33	116	27	143	97	173	270	947	518	1465	1465

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T4 Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2006)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Type de relation de couple*																			
sans partenaire, seul-e	31.1	33.6	31.9	42.0	25.2	38.0	37.8	43.6	39.1	62.8	48.5	59.9	19.6	12.4	13.9	35.9	26.4	32.4	1'248
relations temporaires	4.7	6.0	5.1	9.6	11.2	10.0	9.4	12.7	10.2	7.5	7.6	7.5	4.3	1.9	2.4	6.0	5.2	5.7	221
parten. fixe, vivant séparé	13.1	13.6	13.2	19.2	27.1	21.1	19.4	14.5	18.3	11.7	22.7	13.9	8.7	10.9	10.4	14.0	14.3	14.1	545
parten. fixe, mén. commun	51.1	46.7	49.8	29.1	36.4	30.9	33.3	29.1	32.3	18.0	21.2	18.7	67.4	74.8	73.3	44.1	54.0	47.8	1'843
N**	1'385	580	1'965	333	107	440	180	55	235	266	66	332	138	531	670	2'425	1'431	3'857	3'857
données manquantes	916	333	1'249	152	35	187	52	19	71	224	46	270	150	256	407	1'584	752	2'337	2'337
Nombre d'enfants propres*																			
aucun	43.2	34.6	40.7	71.9	60.3	69.2	71.9	73.3	72.2	90.1	82.7	88.7	43.7	26.9	30.6	55.1	39.1	49.3	2'249
1 enfant	19.3	22.7	20.3	15.1	25.0	17.4	16.6	16.7	16.6	6.3	12.3	7.5	13.8	17.0	16.5	16.7	19.5	17.8	811
2 enfants	25.1	28.4	26.1	10.0	9.5	9.9	8.5	10.0	8.9	3.0	1.2	2.7	23.6	36.4	33.4	18.9	27.3	22.0	1'002
3 enfants ou plus	12.4	14.2	12.9	3.1	5.2	3.6	3.0	0.0	2.3	0.6	3.7	1.2	19.0	19.7	19.5	9.3	14.0	11.0	501
N**	1'659	682	2'341	391	116	507	199	60	259	334	81	415	174	594	770	2'915	1'646	4'563	4'563
données manquantes	642	231	873	94	26	120	33	14	47	156	31	187	114	193	307	1'094	537	1'631	1'631
Nombre d'enfants dans le ménage*																			
aucun	73.6	65.1	71.1	82.6	69.8	79.4	79.6	81.6	80.1	71.7	63.5	70.2	51.6	44.6	46.2	73.3	58.7	68.0	2'742
1 enfant	11.3	18.8	13.6	9.2	19.8	11.8	11.4	10.2	11.1	7.2	14.3	8.4	18.3	20.2	19.7	11.3	18.6	14.0	563
2 enfants	10.5	11.9	10.9	5.5	6.6	5.8	6.0	6.1	6.0	14.0	14.3	14.0	21.6	26.2	25.1	10.6	16.7	12.8	518
3 enfants ou plus	4.6	4.1	4.4	2.8	3.8	3.0	3.0	2.0	2.8	7.2	7.9	7.3	8.5	9.0	8.9	4.8	6.0	5.3	212
N**	1'482	637	2'119	327	106	433	167	49	216	293	63	356	153	531	684	2'554	1'481	4'035	4'035
données manquantes	819	276	1'095	158	36	194	65	25	90	197	49	246	135	256	393	1'455	702	2'159	2'159

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T5 Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2006)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Plus haute formation achevée*																			
aucune form. achevée	3.8	3.8	3.8	6.4	5.8	6.3	6.3	7.9	6.7	9.6	15.7	10.7	5.2	5.6	5.5	5.5	5.7	5.6	235
scolarité obligatoire	15.5	20.5	16.9	33.9	38.3	34.9	22.2	38.1	25.9	50.4	51.8	50.7	24.7	15.5	18.2	24.5	23.4	24.2	1'015
scolarité complémentaire	4.0	5.6	4.4	6.4	10.0	7.2	4.8	12.7	6.7	4.9	10.8	6.0	5.2	4.1	4.4	4.9	6.4	5.4	227
apprentissage/école prof.	59.0	53.2	57.4	48.4	41.7	46.9	57.0	36.5	52.2	30.1	12.0	26.8	42.0	55.8	51.9	51.5	48.8	50.6	2'123
maturité/diplôme	2.9	5.0	3.5	2.2	4.2	2.7	1.4	4.8	2.2	2.7	8.4	3.8	4.0	5.6	5.1	2.8	5.3	3.6	152
école normale, pédagog.	1.1	1.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1.1	4.9	3.9	0.7	2.8	1.4	59
form. profession. supérieure	6.8	5.6	6.4	1.2	0.0	0.9	3.4	0.0	2.6	1.9	0.0	1.6	5.7	3.2	3.9	4.8	3.7	4.4	186
école profession. supérieure	1.3	1.4	1.4	0.7	0.0	0.6	2.4	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	2.9	1.3	1.7	1.2	1.0	1.1	47
haute école spécialisée	1.0	1.2	1.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.7	1.1	1.2	0.8	0.9	0.8	33
université, haute école	4.6	1.9	3.8	0.7	0.0	0.6	1.4	0.0	1.1	0.0	1.2	0.2	7.5	3.0	4.2	3.3	2.1	2.9	121
N**	1'493	575	2'068	407	120	527	207	63	270	365	83	448	174	466	642	2'786	1'410	4'198	4'198
données manquantes	808	338	1'146	78	22	100	25	11	36	125	29	154	114	321	435	1'223	773	1'996	1'996
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	35.3	46.2	38.5	63.8	63.6	63.8	28.8	30.6	29.3	15.9	35.0	18.1	22.9	29.2	27.8	36.9	41.0	38.3	967
apprenti-e, stagiaire	1.6	2.5	1.8	1.1	5.2	2.0	3.6	13.9	6.1	24.5	30.0	25.1	2.4	1.4	1.6	3.7	3.9	3.8	95
manceuvre, aide	6.0	5.0	5.7	4.8	5.2	4.9	6.3	11.1	7.5	3.3	0.0	2.9	2.4	3.1	3.0	5.4	4.3	5.0	127
ouvrier/ère formé-e sur le tas	7.3	5.5	6.8	5.9	5.2	5.7	8.1	0.0	6.1	4.6	0.0	4.1	3.6	4.9	4.6	7.0	4.8	6.3	158
ouvrier/ère formé-e (CFC)	10.9	6.5	9.6	12.5	7.8	11.5	21.6	5.6	17.7	9.9	0.0	8.8	8.4	9.4	9.2	11.8	7.5	10.3	261
contremaître-sse	2.5	0.5	1.9	1.1	0.0	0.9	1.8	0.0	1.4	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	2.1	0.2	1.4	36
employé-e non qualifié-e	10.6	19.6	13.2	7.0	9.1	7.5	13.5	16.7	14.3	9.9	10.0	9.9	13.3	23.3	21.0	10.6	19.7	13.7	347
empl. qualifié-e, cadre moyen	9.0	6.3	8.2	1.1	1.3	1.1	4.5	5.6	4.8	2.6	0.0	2.3	13.3	8.3	9.4	6.7	6.2	6.5	165
employé-e, cadre supérieur	3.7	2.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	9.6	2.4	4.0	2.7	1.7	2.4	60
indépendant-e	10.9	3.5	8.7	1.5	0.0	1.1	5.4	2.8	4.8	3.3	0.0	2.9	20.5	11.5	13.5	8.4	5.5	7.4	187
écolier/ère, étudiant-e	0.7	0.8	0.7	0.4	2.6	0.9	3.6	13.9	6.1	24.5	20.0	24.0	2.4	3.1	3.0	3.5	3.1	3.4	85
autre statut	1.6	1.5	1.5	0.7	0.0	0.6	1.8	0.0	1.4	0.7	5.0	1.2	1.2	3.5	3.0	1.3	2.1	1.5	39
N**	966	398	1'364	271	77	348	111	36	147	151	20	171	83	288	371	1'658	869	2'527	2'527
données manquantes	1'335	515	1'850	214	65	279	121	38	159	339	92	431	205	499	706	2'351	1'314	3'667	3'667

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T6 Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2006)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Source de revenu principale (au cours des 30 derniers jours)*																			
salaire	53.6	36.5	48.9	31.8	24.8	30.0	62.8	37.9	56.7	40.2	16.7	36.2	58.0	54.6	55.5	50.5	41.8	47.5	2'253
économies, épargne	1.3	0.9	1.2	1.4	2.5	1.7	1.1	0.0	0.8	2.0	0.0	1.7	0.5	0.3	0.4	1.3	0.7	1.1	51
rente (AVS, AI ou autre)	15.6	20.3	16.9	16.0	10.7	14.7	5.0	6.9	5.5	3.7	6.9	4.3	13.5	9.8	10.7	13.5	14.3	13.8	655
aide sociale	16.0	16.7	16.2	31.8	38.0	33.3	16.1	29.3	19.3	5.1	16.7	7.1	6.0	3.7	4.2	15.4	13.5	14.7	699
assurance-chômage	8.5	5.0	7.5	9.9	7.4	9.3	5.0	10.3	6.3	4.0	2.8	3.8	2.0	1.5	1.6	7.4	4.0	6.2	296
soutien du/de la partenaire	1.2	16.4	5.4	0.8	3.3	1.4	1.1	1.7	1.3	0.6	1.4	0.7	2.0	24.1	18.6	1.2	16.7	6.7	317
soutien parents/proches/amis	2.4	2.2	2.4	4.4	9.9	5.8	5.6	12.1	7.1	42.7	52.8	44.4	16.0	5.3	8.0	8.8	7.4	8.3	394
deal, combines	0.0	0.1	0.0	0.0	1.7	0.4	1.7	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	6
autres revenus illégaux	0.1	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	5
prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
autre	1.3	1.9	1.5	3.0	1.7	2.7	1.7	0.0	1.3	1.4	2.8	1.7	2.0	0.7	1.0	1.6	1.3	1.5	71
N**	1'805	695	2'500	362	121	483	180	58	238	351	72	423	200	601	802	3'079	1'668	4'748	4'748
données manquantes	496	218	714	123	21	144	52	16	68	139	40	179	88	186	275	930	515	1446	1446
Taux d'activité principal (au cours des 30 derniers jours)*																			
activ. à plein temps (dès 70%)	49.1	25.6	42.5	28.3	17.7	25.9	57.9	28.8	50.9	31.2	14.0	27.9	52.8	31.5	37.1	45.0	26.9	38.8	1'825
activité à temps partiel	4.9	16.8	8.2	2.2	7.3	3.4	1.9	3.0	2.2	3.2	5.8	3.7	5.6	32.4	25.3	4.2	20.1	9.7	455
plusieurs activités occas.	1.4	1.6	1.5	2.7	2.4	2.6	2.9	1.5	2.5	2.4	2.3	2.4	2.6	2.2	2.3	1.9	1.8	1.9	88
en formation	1.7	2.1	1.8	1.2	7.3	2.6	4.3	18.2	7.6	40.3	45.3	41.3	13.3	5.8	7.7	7.6	7.4	7.5	354
sans activité prof.	18.0	34.3	22.6	28.3	25.0	27.6	11.5	22.7	14.2	4.8	15.1	6.8	13.8	22.2	20.0	17.1	27.5	20.7	973
sans trav., en quête d'emploi	18.0	12.4	16.4	26.9	23.4	26.1	12.9	16.7	13.8	11.3	3.5	9.8	6.2	4.2	4.8	16.9	9.9	14.5	682
sans trav., futur empl. garanti	0.2	0.7	0.3	0.5	0.8	0.6	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.3	13
autre	6.7	6.4	6.7	9.9	16.1	11.4	7.7	9.1	8.0	6.7	14.0	8.1	5.6	1.8	2.8	7.2	6.0	6.8	318
N**	1'706	668	2'374	413	124	537	209	66	275	372	86	458	195	553	750	3'083	1'623	4'708	4'708
données manquantes	595	245	840	72	18	90	23	8	31	118	26	144	93	234	327	926	560	1486	1486

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T7 Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2006)

	Patient-e-s: problème principale									Proches			Toutes prises en charge						
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Revenu mensuel net (6 derniers mois)*																			
aucun revenu	26.1	36.4	28.9	29.6	37.8	31.4	21.0	18.8	20.5	41.6	76.5	45.8	4.5	28.0	22.7	27.7	36.4	30.1	410
moins de 1000 fr.	4.6	5.3	4.8	7.4	8.9	7.7	9.7	6.3	9.0	32.8	11.8	30.3	13.6	9.3	10.3	9.3	7.9	8.9	121
de 1001 à 2000 fr.	10.2	14.1	11.3	19.1	8.9	16.9	6.5	25.0	10.3	4.8	0.0	4.2	13.6	16.0	15.5	10.5	13.7	11.4	155
de 2001 à 3000 fr.	12.2	21.8	14.8	20.4	26.7	21.7	8.1	18.8	10.3	3.2	5.9	3.5	13.6	21.3	19.6	11.9	20.6	14.3	195
de 3001 à 4000 fr.	13.3	11.7	12.8	17.3	15.6	16.9	19.4	18.8	19.2	8.0	5.9	7.7	13.6	13.3	13.4	14.4	12.1	13.8	187
de 4001 à 5000 fr.	17.0	4.9	13.7	4.9	2.2	4.3	24.2	12.5	21.8	7.2	0.0	6.3	13.6	6.7	8.2	14.2	4.7	11.5	157
de 5001 à 6000 fr.	8.3	3.4	7.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	3.8	1.6	0.0	1.4	0.0	4.0	3.1	5.9	2.6	5.0	68
de 6001 à 8000 fr.	6.7	1.9	5.4	1.2	0.0	1.0	3.2	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	13.6	1.3	4.1	4.6	1.6	3.8	51
de 8001 à 10 000 fr.	1.1	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.3	0.8	0.0	0.7	4.5	0.0	1.0	0.9	0.3	0.7	10
de 10 001 à 15 000 fr.	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	2.1	0.6	0.0	0.4	6
plus de 15 000 fr.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
N**	566	206	772	162	45	207	62	16	78	125	17	142	22	75	97	981	379	1'360	1'360
<i>données manquantes</i>	1'735	707	2'442	323	97	420	170	58	228	365	95	460	266	712	980	3'028	1'804	4'834	4'834
Dettes*																			
aucune dette	63.5	77.1	67.6	32.2	42.6	34.4	33.7	52.0	37.2	85.0	83.7	84.8	88.5	93.2	92.1	60.4	77.9	66.0	1'347
jusqu'à 5000 fr.	6.6	8.2	7.1	17.3	13.0	16.4	13.5	16.0	14.0	4.7	6.1	5.0	1.6	2.1	2.0	8.1	7.0	7.7	158
de 5001 à 10 000 fr.	6.8	4.4	6.1	16.8	14.8	16.4	14.4	16.0	14.7	5.6	4.1	5.3	0.0	2.1	1.6	8.3	5.0	7.3	148
de 10 001 à 25 000 fr.	9.2	5.1	8.0	10.9	25.9	14.1	21.2	4.0	17.8	2.6	2.0	2.5	3.3	1.6	2.0	9.1	6.1	8.1	166
de 25 001 à 50 000 fr.	5.9	2.7	5.0	8.9	1.9	7.4	9.6	0.0	7.8	1.3	4.1	1.8	3.3	0.5	1.2	6.3	1.8	4.9	99
de 50 001 à 100 000 fr.	2.9	1.0	2.3	9.4	1.9	7.8	5.8	8.0	6.2	0.0	0.0	0.0	1.6	0.5	0.8	3.8	1.2	2.9	60
plus de 100 000 fr.	5.0	1.4	4.0	4.5	0.0	3.5	1.9	4.0	2.3	0.9	0.0	0.7	1.6	0.0	0.4	4.0	1.1	3.0	62
N**	694	293	987	202	54	256	104	25	129	233	49	282	61	192	253	1'380	660	2'040	2'040
<i>données manquantes</i>	1'607	620	2'227	283	88	371	128	49	177	257	63	320	227	595	824	2'629	1'523	4'154	4'154

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T8 Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2006)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Emprisonnement ou détention préventive*																
aucun-e	84.1	96.5	87.8	43.5	78.3	49.8	60.0	78.3	64.3	91.2	94.7	91.6	77.5	94.2	82.0	1'526
emprisonnement	10.3	1.6	7.7	20.8	2.2	17.4	9.3	13.0	10.2	4.1	0.0	3.6	11.1	2.0	8.6	161
détention préventive	3.1	1.3	2.6	14.5	15.2	14.6	25.3	8.7	21.4	4.8	0.0	4.2	6.3	2.8	5.4	100
emprisonnement et détention préventive	2.5	0.5	1.9	21.3	4.3	18.2	5.3	0.0	4.1	0.0	5.3	0.6	5.1	1.0	4.0	75
N**	881	372	1'253	207	46	253	75	23	98	147	19	166	1'365	497	1'862	1'862
<i>données manquantes</i>	1'420	541	1'961	278	96	374	157	51	208	343	93	436	2'356	899	3'255	3'255
Durée totale de détention***																
jusqu'à 1 mois	24.2	40.0	25.7	18.4	60.0	21.0	42.1	66.7	45.5	60.0	0.0	54.5	25.4	47.4	27.2	62
> 1 à 2 mois	17.2	20.0	17.4	10.5	0.0	9.9	15.8	0.0	13.6	10.0	100.0	18.2	13.9	15.8	14.0	32
> 2 à 6 mois	22.2	10.0	21.1	26.3	0.0	24.7	10.5	33.3	13.6	10.0	0.0	9.1	22.5	10.5	21.5	49
> 6 à 12 mois	9.1	10.0	9.2	10.5	20.0	11.1	15.8	0.0	13.6	10.0	0.0	9.1	10.5	10.5	10.5	24
plus de 1 an	27.3	20.0	26.6	34.2	20.0	33.3	15.8	0.0	13.6	10.0	0.0	9.1	27.8	15.8	26.8	61
N**	99	10	109	76	5	81	19	3	22	10	1	11	209	19	228	228
<i>données manquantes</i>	41	3	44	41	5	46	11	2	13	3	0	3	98	10	108	108

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de détention. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T9 Instance d'envoi principale et secondaire, selon le problème principal et chez les proches (2006)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Instance d'envoi principale*																			
initiative personnelle	26.5	35.7	29.1	53.7	45.7	51.8	38.3	32.9	36.9	21.4	24.5	22.0	52.5	67.2	63.5	32.1	48.6	38.1	1'952
conjoint-e/partenaire	6.7	4.7	6.1	4.0	2.4	3.6	8.6	2.9	7.2	3.4	1.1	3.0	3.8	3.2	3.3	6.0	3.5	5.1	262
famille	3.5	4.7	3.8	2.6	7.1	3.6	9.1	8.6	9.0	10.0	9.6	9.9	10.6	5.3	6.7	5.2	5.6	5.3	272
ami-e-s, collègues, connaiss.	2.0	3.3	2.4	1.2	1.6	1.3	2.9	4.3	3.2	1.5	3.2	1.8	3.8	5.1	4.7	2.3	4.1	2.9	150
instit. ambulatoire spécialisée	1.7	2.2	1.8	4.3	4.7	4.4	1.9	4.3	2.5	1.2	0.0	1.0	0.8	1.2	1.1	2.0	1.8	1.9	99
instit. résidentielle spécialisée	6.4	6.4	6.4	3.6	4.7	3.8	4.3	1.4	3.6	0.7	1.1	0.8	0.8	0.9	0.9	4.5	3.4	4.1	211
cabinet médical	8.4	10.6	9.0	7.6	9.4	8.0	4.3	5.7	4.7	3.4	5.3	3.8	4.2	5.2	4.9	6.9	8.2	7.4	378
hôpital, clinique	11.3	14.5	12.3	2.1	0.8	1.8	2.9	11.4	5.0	2.4	4.3	2.8	1.7	1.9	1.9	7.4	7.4	7.4	381
service sociaux	7.3	6.3	7.0	6.2	13.4	7.8	2.9	10.0	4.7	3.9	5.3	4.2	5.5	3.8	4.2	6.3	5.8	6.1	315
mes. pénale/administrative	17.7	5.8	14.3	9.7	5.5	8.8	19.1	10.0	16.8	44.0	28.7	41.2	7.6	1.3	2.9	18.7	5.0	13.7	705
employeur/se	5.0	2.6	4.3	0.2	2.4	0.7	0.5	2.9	1.1	1.5	2.1	1.6	2.5	0.9	1.3	3.6	2.1	3.1	157
enseignant-e	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.7	1.5	3.2	1.8	1.7	0.6	0.9	0.5	0.6	0.6	29
autre	3.1	3.3	3.2	4.8	2.4	4.2	5.3	2.9	4.7	5.1	11.7	6.3	4.2	3.6	3.8	4.4	4.0	4.3	218
N**	1'816	729	2'545	421	127	548	209	70	279	411	94	505	236	693	931	3'279	1'848	5'129	5'129
données manquantes	485	184	669	64	15	79	23	4	27	79	18	97	52	94	146	730	335	1'065	1'065
Instance d'envoi secondaire***																			
initiative personnelle	26.5	25.8	26.3	23.2	30.9	24.8	38.9	36.4	38.3	20.6	18.2	20.3	11.7	11.0	11.1	25.6	20.8	24.1	674
conjoint-e/partenaire	9.1	7.3	8.6	7.7	14.7	9.1	6.5	6.1	6.4	3.9	0.0	3.5	10.4	6.0	6.9	8.2	7.2	7.9	221
famille	4.2	7.3	5.0	8.5	8.8	8.6	10.2	15.2	11.3	7.2	9.1	7.4	9.1	10.0	9.8	5.8	8.6	6.7	189
ami-e-s, collègues, connaiss.	2.0	3.7	2.5	3.3	1.5	2.9	2.8	12.1	5.0	0.6	4.5	1.0	2.6	5.3	4.8	2.2	4.4	2.9	82
instit. ambulatoire spécialisée	1.1	1.6	1.2	3.7	4.4	3.8	1.9	3.0	2.1	0.6	0.0	0.5	1.3	3.0	2.6	1.4	2.3	1.7	48
instit. résidentielle spécialisée	2.8	3.0	2.9	2.6	2.9	2.7	1.9	3.0	2.1	0.0	0.0	0.0	1.3	0.3	0.5	2.3	1.9	2.1	60
cabinet médical	5.2	8.0	5.9	10.7	13.2	11.2	6.5	3.0	5.7	2.2	0.0	2.0	2.6	1.0	1.3	5.7	5.4	5.6	158
hôpital, clinique	3.0	4.2	3.3	2.2	4.4	2.7	0.9	3.0	1.4	0.6	4.5	1.0	2.6	1.3	1.6	2.4	3.0	2.6	72
service sociaux	3.3	4.0	3.5	5.5	7.4	5.9	1.9	6.1	2.8	3.9	4.5	4.0	2.6	2.3	2.4	3.5	4.0	3.6	102
mes. pénale/administrative	3.7	1.4	3.1	4.8	5.9	5.0	6.5	0.0	5.0	1.7	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	3.6	1.1	2.8	78
employeur/se	3.2	2.1	2.9	1.1	1.5	1.2	1.9	0.0	1.4	0.6	0.0	0.5	1.3	0.3	0.5	2.5	1.3	2.1	59
enseignant-e	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.0	0.0	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	9
autre	1.9	1.9	1.9	3.3	2.9	3.2	3.7	6.1	4.3	2.2	4.5	2.5	0.0	2.3	1.9	2.3	2.4	2.3	65
aucune	42.8	39.8	42.0	38.4	29.4	36.6	36.1	30.3	34.8	60.0	54.5	59.4	54.5	61.5	60.1	44.0	46.9	44.9	1'259
N**	1'181	427	1'608	271	68	339	108	33	141	180	22	202	77	301	378	1'899	902	2'801	2'801
données manquantes	1'120	486	1'606	214	74	288	124	41	165	310	90	400	211	486	699	2'110	1'281	3'393	3'393

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles)

T10 Type d'aide attendue à l'admission et statut légal de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2006)

Type d'aide attendue*	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
problèmes addictifs	79.7	88.2	82.1	86.0	87.8	86.4	79.0	91.9	82.1	62.0	66.7	62.6	51.6	53.6	53.0	76.1	74.4	75.5	2'542
problèmes somatiques	4.1	4.4	4.2	2.9	6.1	3.5	1.7	8.1	3.2	0.0	0.0	0.0	0.8	1.2	1.1	3.2	3.5	3.3	110
problèmes psychiques	18.5	23.6	19.9	20.4	26.8	21.7	20.2	24.3	21.2	9.1	25.9	11.1	19.4	24.0	23.2	18.2	25.2	20.7	696
problèmes relationnels	15.7	23.4	17.9	13.7	14.6	13.9	12.6	16.2	13.5	9.1	7.4	8.9	27.4	45.4	41.5	15.7	30.2	20.7	698
problèmes familiaux	10.2	17.7	12.3	12.7	23.2	14.9	12.6	29.7	16.7	14.4	25.9	15.7	40.3	41.1	41.0	12.9	27.4	17.9	603
problèmes financiers	9.0	7.4	8.6	26.8	18.3	25.0	16.0	16.2	16.0	4.8	3.7	4.7	1.6	6.5	5.4	11.6	8.1	10.4	351
problèmes professionnels, de formatic	16.1	12.4	15.1	17.5	9.8	15.9	10.9	18.9	12.8	11.1	14.8	11.5	3.2	6.7	5.9	14.3	10.3	12.9	436
problèmes de logement	4.6	3.6	4.3	8.6	7.3	8.3	10.1	13.5	10.9	2.9	0.0	2.6	2.4	3.8	3.5	5.1	4.2	4.8	160
problèmes de violence	1.0	2.1	1.3	1.3	3.7	1.8	1.7	0.0	1.3	1.4	0.0	1.3	1.6	4.8	4.1	1.2	2.9	1.8	61
problèmes juridiques	13.1	6.3	11.1	10.2	3.7	8.8	21.0	10.8	18.6	15.9	3.7	14.5	4.0	3.6	3.7	12.5	4.9	9.9	333
autre(s)	2.3	1.7	2.1	2.5	2.4	2.5	3.4	2.7	3.2	1.4	3.7	1.7	10.5	4.1	5.7	3.7	3.2	3.5	119
aucune attente	8.9	4.2	7.6	2.5	1.2	2.3	5.0	2.7	4.5	20.2	14.8	19.6	0.0	0.5	0.4	8.4	2.8	6.4	217
N**	1'340	526	1'866	314	82	396	119	37	156	208	27	235	124	416	542	2'211	1'155	3'368	3'368
données manquantes	961	387	1'348	171	60	231	113	37	150	282	85	367	164	371	535	1'798	1'028	2'826	2'826
Statut légal du traitement/de la prise en charge*																			
suspension de la procédure, renoncement à infliger une peine, réprimande (art 19a ch. 2 Lstup)	0.3	0.0	0.2	0.7	0.0	0.6	0.9	0.0	0.7	5.5	9.5	5.9	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	0.7	20
abandon poursuite pénale si soumis à des mesures de protection contrôlées par un médecin (art 19a ch. 3 Lstup)	0.1	0.0	0.1	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	3
mesures concernant les délinquants anormaux (art 43 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1
traitement des alcooliques et des toxicomanes (art 44 CPS)	2.8	1.8	2.5	3.0	1.5	2.7	2.8	3.1	2.9	2.7	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.6	1.1	2.1	59
irresponsabilité (art 10 CPS)	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1
responsabilité restreinte (art 11 CPS)	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1
exécution de mesures pr toxicomanes dans une maison d'éducation au travail (art 2a ord. 3 rel. au CPS RS 311.03)	0.6	0.2	0.5	0.7	1.5	0.9	0.9	0.0	0.7	9.3	9.5	9.4	0.0	0.0	0.0	1.4	0.4	1.1	31
autre	12.5	7.6	11.2	7.5	4.6	6.9	23.1	15.6	21.4	25.8	14.3	24.6	1.3	0.0	0.3	13.1	5.0	10.4	293
aucune mesure (traitement volontaire)	83.6	90.3	85.5	87.3	92.3	88.3	71.3	81.3	73.6	56.6	66.7	57.6	98.8	100.0	99.7	81.7	93.3	85.6	2'410
N**	1'174	445	1'619	267	65	332	108	32	140	182	21	203	80	319	399	1'888	929	2'817	2'817
données manquantes	1'127	468	1'595	218	77	295	124	42	166	308	91	399	208	468	678	2'121	1'254	3'377	3'377

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T11 Traitements/prises en charge avant l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2006)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Prises en charge antérieures*																			
non	42.7	39.9	41.8	16.8	15.6	16.5	50.5	50.8	50.6	76.7	79.6	77.2	70.8	70.4	70.5	47.2	52.3	49.0	2'384
oui	57.3	60.1	58.2	83.2	84.4	83.5	49.5	49.2	49.4	23.3	20.4	22.8	29.2	29.6	29.5	52.8	47.7	51.0	2'480
N**	1'748	740	2'488	404	122	526	206	65	271	416	93	509	202	585	787	3'139	1'725	4'864	4'864
<i>données manquantes</i>	553	173	726	81	20	101	26	9	35	74	19	93	86	202	290	870	458	1330	1330
Type de prise en charge***																			
traitement avec prescript. d'héroïne	0.9	0.7	0.8	6.7	5.4	6.4	1.2	3.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.3	1.8	37
substitution (méthadone, subutex)	6.7	4.0	5.8	67.5	67.4	67.5	25.3	43.3	30.1	6.6	23.1	9.0	8.6	2.5	3.8	20.0	14.1	18.0	380
autre tt médicam. des dépendances	11.7	9.9	11.1	10.8	8.7	10.3	2.4	6.7	3.5	2.6	7.7	3.4	2.9	2.5	2.5	10.3	8.0	9.5	201
prise en charge ambulatoire	65.3	57.8	62.9	60.1	57.6	59.4	71.1	56.7	67.3	78.9	76.9	78.7	68.6	88.5	84.1	65.7	63.5	64.9	1'369
traitement résidentiel	49.0	56.8	51.4	41.8	39.1	41.1	42.2	40.0	41.6	22.4	30.8	23.6	25.7	9.8	13.4	44.6	43.7	44.3	933
sevrage	39.2	42.0	40.1	53.4	46.7	51.7	30.1	46.7	34.5	11.8	30.8	14.6	17.1	5.7	8.3	38.7	35.2	37.5	791
groupe d'entraide ou d'auto-support	7.3	8.6	7.8	3.0	5.4	3.6	2.4	6.7	3.5	1.3	0.0	1.1	0.0	4.9	3.8	5.5	6.8	6.0	126
autre(s)	3.0	3.0	3.0	3.4	3.3	3.3	4.8	3.3	4.4	5.3	7.7	5.6	14.3	8.2	9.6	3.8	4.6	4.0	85
N**	898	405	1'303	268	92	360	83	30	113	76	13	89	35	122	157	1'407	701	2'108	2'108
<i>données manquantes</i>	104	40	144	68	11	79	19	2	21	21	6	27	24	51	75	251	121	372	372

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de prise en charge antérieure. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T12 Substitution et autre traitement/prise en charge à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2006)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution ou prescription d'héroïne*																
non	97.1	97.4	97.2	57.2	49.5	55.4	89.4	81.5	87.5	98.9	98.6	98.9	91.2	91.1	91.2	3'114
oui	2.9	2.6	2.8	42.8	50.5	44.6	10.6	18.5	12.5	1.1	1.4	1.1	8.8	8.9	8.8	300
N**	1'511	585	2'096	341	103	444	170	54	224	368	72	440	2'514	900	3'414	3'414
données manquantes	790	328	1'118	144	39	183	62	20	82	122	40	162	1'207	496	1'703	1'703
Type de substitution***																
héroïne	2.5	0.0	1.9	4.8	5.9	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.9	3.8	11
méthadone	72.5	84.6	75.5	88.4	90.2	88.8	82.4	90.0	85.2	75.0	100.0	80.0	85.0	88.3	85.9	250
autres opiacés	5.0	0.0	3.8	5.5	3.9	5.1	11.8	10.0	11.1	0.0	0.0	0.0	5.6	5.2	5.5	16
autres substances	20.0	15.4	18.9	1.4	0.0	1.0	5.9	0.0	3.7	25.0	0.0	20.0	5.6	2.6	4.8	14
N**	40	13	53	146	51	197	17	10	27	4	1	5	214	77	291	291
données manquantes	4	2	6	0	1	1	1	0	1	0	0	0	6	3	9	9
Autre prise en charge parallèle*																
non	86.8	83.4	85.9	76.7	69.6	75.4	83.3	75.6	81.6	93.1	93.9	93.2	85.5	82.3	84.7	2'293
oui	13.2	16.6	14.1	23.3	30.4	24.6	16.7	24.4	18.4	6.9	6.1	6.8	14.5	17.7	15.3	414
N**	1'222	464	1'686	331	79	410	144	41	185	231	33	264	2'024	683	2'707	2'707
données manquantes	1079	449	1528	154	63	217	88	33	121	259	79	338	1697	713	2410	2410
Type de la prise en charge parallèle****																
prise en charge ambulatoire	63.5	65.8	64.3	74.0	79.2	75.2	69.6	50.0	63.6	81.3	100.0	83.3	68.6	68.3	68.5	281
traitement résidentiel	12.6	10.5	11.9	11.7	20.8	13.9	21.7	20.0	21.2	6.3	0.0	5.6	12.8	12.5	12.7	52
groupe d'entraide ou d'auto-support	6.9	6.6	6.8	2.6	0.0	2.0	4.3	10.0	6.1	0.0	0.0	0.0	4.8	5.0	4.9	20
autre(s)	22.0	23.7	22.6	15.6	0.0	11.9	13.0	20.0	15.2	12.5	0.0	11.1	18.6	18.3	18.5	76
N**	159	76	235	77	24	101	23	10	33	16	2	18	290	120	410	410
données manquantes	2	1	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	1	4	4

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de substitution. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s pris-e-s en charge parallèlement. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T13a Admission suite à une cure de sevrage, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2006)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Admission suite à une cure de sevrage*																
non	74.9	72.7	74.3	86.3	85.7	86.2	89.2	87.5	88.8	97.1	83.3	95.9	80.3	77.0	79.5	1'845
sevrage dans la même institution	1.2	1.4	1.2	0.4	1.6	0.6	0.0	3.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.8	1.4	0.9	22
sevrage dans une autre institution	23.9	25.9	24.5	13.4	12.7	13.2	10.8	9.4	10.5	2.9	16.7	4.1	18.9	21.6	19.6	455
N**	1'119	428	1'547	262	63	325	111	32	143	175	18	193	1'735	587	2'322	2'322
<i>données manquantes</i>	1'182	485	1'667	223	79	302	121	42	163	315	94	409	1'986	809	2'795	2'795

T13b Fréquence des sevrages sans aide professionnelle avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2006)

Fréq. sevrages sans accompagnement*	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%					
jamais	57.3	52.9	56.2	18.6	23.8	19.9	52.5	38.9	49.4	72.6	85.7	73.5	53.6	50.2	52.7	599
une fois	9.7	6.9	9.0	10.9	9.5	10.5	13.1	11.1	12.7	13.7	0.0	12.7	10.5	8.1	9.9	112
deux ou trois fois	12.4	12.2	12.3	21.7	23.8	22.2	6.6	22.2	10.1	5.3	0.0	4.9	12.0	13.7	12.4	141
plus de trois fois	20.6	28.0	22.5	48.8	42.9	47.4	27.9	27.8	27.8	8.4	14.3	8.8	24.0	28.1	25.0	284
N**	525	189	714	129	42	171	61	18	79	95	7	102	851	285	1'136	1'136
<i>données manquantes</i>	1'776	724	2'500	356	100	456	171	56	227	395	105	500	2'870	1'111	3'981	3'981

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T14 Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2006)

Tous patients et patientes										
Problème principal*	Hommes	Femmes	Total	N		Hommes	Femmes	Total	N	
	%	%	%			%	%	%		
alcool	62.2	66.2	63.3	3'214	alcool	62.2	66.2	63.3	3'214	
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.5	0.7	0.6	29	cocktails	0.5	0.7	0.6	29	
héroïne	11.4	7.9	10.5	531	opiacés	12.6	9.6	11.8	598	
méthadone	1.1	1.2	1.1	55						
autres opiacés	0.1	0.6	0.2	12						
cocaïne	6.2	5.4	6.0	303	cocaïne et dérivés	6.3	5.4	6.0	306	
crack, freebase	0.1	0.0	0.1	3						
amphétamines	0.2	0.1	0.2	11	stimulants	0.5	0.2	0.4	20	
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.2	0.1	0.2	9						
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0						
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0	médicaments	0.6	1.0	0.7	38	
benzodiazépines	0.5	0.9	0.6	33						
autres somnifères et tranquillisants	0.1	0.1	0.1	5						
LSD	0.0	0.0	0.0	0	hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	1	
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	1						
cannabis	13.2	8.1	11.9	602	cannabis	13.2	8.1	11.9	602	
tabac	1.3	3.0	1.8	89	tabac	1.3	3.0	1.8	89	
substances volatiles	0.1	0.1	0.1	3	autres substances	0.3	0.8	0.4	21	
autre substance	0.2	0.7	0.4	18						
jeu pathologique	1.7	0.8	1.5	75	troubles assimilables à une addiction	2.5	5.1	3.2	161	
troubles alimentaires	0.1	2.7	0.8	39						
autres troubles assimilables à une addiction	0.7	1.6	0.9	47						
N**	3'699	1'380	5'079	5'079		3'699	1'380	5'079	5'079	
<i>données manquantes</i>	22	16	38	38		22	16	38	38	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T15.1a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2006), hommes

Patientes: principale substance posant problème										
Hommes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*										
jamais	28.2	20.0	27.1	37.2	33.3	5.3	100.0	21.4	0.0	0.0
1 jour par semaine ou moins	7.8	13.3	12.2	16.8	25.0	0.0	0.0	14.7	0.0	50.0
2 à 3 jours par semaine	13.3	40.0	11.3	22.5	41.7	0.0	0.0	22.2	0.0	0.0
4 à 6 jours par semaine	11.5	6.7	8.3	7.3	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0
une fois par jour	7.0	6.7	15.8	5.8	0.0	21.1	0.0	9.8	2.6	25.0
plusieurs fois par jour	32.2	13.3	25.3	10.5	0.0	73.7	0.0	21.4	97.4	25.0
N**	1'315	15	336	191	12	19	1	388	38	4
données manquantes	986	5	129	41	5	5	0	102	10	6
Fréquence de consommation 6 derniers mois (%)*										
jamais	9.0	13.3	22.3	16.9	9.1	10.0	0.0	6.7	2.7	0.0
1 jour par semaine ou moins	7.3	6.7	16.0	23.6	27.3	0.0	0.0	16.2	0.0	20.0
2 à 3 jours par semaine	15.6	46.7	12.5	27.7	36.4	10.0	100.0	23.8	0.0	0.0
4 à 6 jours par semaine	14.8	6.7	9.0	8.1	27.3	0.0	0.0	10.8	2.7	0.0
une fois par jour	8.8	0.0	16.0	6.8	0.0	20.0	0.0	8.6	2.7	20.0
plusieurs fois par jour	44.5	26.7	24.2	16.9	0.0	60.0	0.0	34.0	91.9	60.0
N**	1'199	15	256	148	11	10	1	315	37	5
données manquantes	1102	5	209	84	6	14	0	175	11	5

T15.1b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2006), hommes

Patients: problème principal			
Hommes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*			
jamais	50.0	0.0	28.6
1 jour par semaine ou moins	19.0	0.0	0.0
2 à 3 jours par semaine	14.3	0.0	0.0
4 à 6 jours par semaine	2.4	0.0	28.6
1 fois par jour	0.0	0.0	42.9
plusieurs fois par jour	14.3	0.0	0.0
N**	42	0	7
données manquantes	22	2	18
Fréquence d'apparition au cours des 6 derniers mois (%)*			
jamais	34.4	0.0	14.3
1 jour par semaine ou moins	28.1	0.0	0.0
2 à 3 jours par semaine	15.6	0.0	14.3
4 à 6 jours par semaine	3.1	0.0	28.6
1 fois par jour	3.1	0.0	14.3
plusieurs fois par jour	15.6	0.0	28.6
N**	32	0	7
données manquantes	32	2	18

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T15.2a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2006), femmes

Patientes: principale substance posant problème										
Femmes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*										
jamais	23.2	42.9	24.2	28.1	0.0	30.0	0.0	14.3	0.0	0.0
1 jour par semaine ou moins	11.5	14.3	13.1	24.6	0.0	0.0	0.0	20.2	5.7	0.0
2 à 3 jours par semaine	14.2	14.3	5.1	28.1	50.0	0.0	0.0	17.9	0.0	50.0
4 à 6 jours par semaine	13.4	14.3	6.1	10.5	0.0	0.0	0.0	1.2	2.9	0.0
une fois par jour	8.0	0.0	22.2	1.8	50.0	10.0	0.0	21.4	2.9	0.0
plusieurs fois par jour	29.8	14.3	29.3	7.0	0.0	60.0	0.0	25.0	88.6	50.0
N**	514	7	99	57	2	10	0	84	35	2
<i>données manquantes</i>	399	2	34	17	1	4	0	28	6	9
Fréquence de consommation 6 derniers mois (%)*										
jamais	6.6	28.6	14.8	7.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0
1 jour par semaine ou moins	9.3	0.0	9.9	32.6	0.0	20.0	0.0	23.9	3.0	0.0
2 à 3 jours par semaine	17.4	42.9	12.3	23.3	100.0	0.0	0.0	19.7	0.0	20.0
4 à 6 jours par semaine	16.5	14.3	7.4	18.6	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0
une fois par jour	8.3	0.0	19.8	2.3	0.0	20.0	0.0	9.9	3.0	0.0
plusieurs fois par jour	41.9	14.3	35.8	16.3	0.0	60.0	0.0	39.4	93.9	80.0
N**	484	7	81	43	1	5	0	71	33	5
<i>données manquantes</i>	429	2	52	31	2	9	0	41	8	6

T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2006), femmes

Patients: problème principal			
Femmes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*			
jamais	28.6	0.0	20.0
1 jour par semaine ou moins	28.6	9.1	20.0
2 à 3 jours par semaine	14.3	18.2	50.0
4 à 6 jours par semaine	14.3	22.7	0.0
1 fois par jour	0.0	13.6	0.0
plusieurs fois par jour	14.3	36.4	10.0
N**	7	22	10
<i>données manquantes</i>	4	15	12
Fréquence d'apparition au cours des 6 derniers mois (%)*			
jamais	60.0	0.0	20.0
1 jour par semaine ou moins	20.0	10.5	30.0
2 à 3 jours par semaine	20.0	21.1	30.0
4 à 6 jours par semaine	0.0	26.3	10.0
1 fois par jour	0.0	10.5	0.0
plusieurs fois par jour	0.0	31.6	10.0
N**	5	19	10
<i>données manquantes</i>	6	18	12

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T15.3a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2006), hommes & femmes

Patientes: principale substance posant problème										
Hommes & femmes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*										
jamais	26.8	27.3	26.4	35.1	28.6	13.8	100.0	20.1	0.0	0.0
1 jour par semaine ou moins	8.9	13.6	12.4	18.5	21.4	0.0	0.0	15.7	2.7	33.3
2 à 3 jours par semaine	13.6	31.8	9.9	23.8	42.9	0.0	0.0	21.4	0.0	16.7
4 à 6 jours par semaine	12.0	9.1	7.8	8.1	0.0	0.0	0.0	8.9	1.4	0.0
une fois par jour	7.3	4.5	17.2	4.8	7.1	17.2	0.0	11.9	2.7	16.7
plusieurs fois par jour	31.5	13.6	26.2	9.7	0.0	69.0	0.0	22.0	93.2	33.3
N**	1'829	22	435	248	14	29	1	472	73	6
données manquantes	1385	7	163	58	6	9	0	130	16	15
Fréquence de consommation 6 derniers mois (%)*										
jamais	8.3	18.2	20.5	14.7	8.3	6.7	0.0	6.0	1.4	0.0
1 jour par semaine ou moins	7.8	4.5	14.5	25.7	25.0	6.7	0.0	17.6	1.4	10.0
2 à 3 jours par semaine	16.1	45.5	12.5	26.7	41.7	6.7	100.0	23.1	0.0	10.0
4 à 6 jours par semaine	15.3	9.1	8.6	10.5	25.0	0.0	0.0	9.6	1.4	0.0
une fois par jour	8.7	0.0	16.9	5.8	0.0	20.0	0.0	8.8	2.9	10.0
plusieurs fois par jour	43.8	22.7	27.0	16.8	0.0	60.0	0.0	35.0	92.9	70.0
N**	1'683	22	337	191	12	15	1	386	70	10
données manquantes	1531	7	261	115	8	23	0	216	19	11

T15.3b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2006), hommes & femmes

Patients: problème principal			
Hommes & femmes	Jeux pathologiques	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*			
jamais	46.9	0.0	23.5
1 jour par semaine ou moins	20.4	9.1	11.8
2 à 3 jours par semaine	14.3	18.2	29.4
4 à 6 jours par semaine	4.1	22.7	11.8
1 fois par jour	0.0	13.6	17.6
plusieurs fois par jour	14.3	36.4	5.9
N**	49	22	17
données manquantes	26	17	30
Fréquence d'apparition au cours des 6 derniers mois (%)*			
jamais	37.8	0.0	17.6
1 jour par semaine ou moins	27.0	10.5	17.6
2 à 3 jours par semaine	16.2	21.1	23.5
4 à 6 jours par semaine	2.7	26.3	17.6
1 fois par jour	2.7	10.5	5.9
plusieurs fois par jour	13.5	31.6	17.6
N**	37	19	17
données manquantes	38	20	30

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T16.1a Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2006), hommes

Patients: principale substance posant problème										
Hommes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation										
moyenne	16.2	21.8	20.6	22.2	19.4	23.0	22.0	15.0	15.9	18.8
écart-type	4.3	3.4	5.2	5.9	7.4	3.6	.	1.9	4.4	8.5
1er quartile	15.0	18.5	17.0	17.0	15.5	21.0	22.0	14.0	13.0	15.0
valeur médiane	16.0	22.5	19.0	20.0	17.5	25.0	22.0	15.0	15.0	15.0
3e quartile	18.0	24.5	23.0	26.0	19.5	25.0	22.0	16.0	19.0	16.0
N*	798	12	286	169	12	9	1	323	17	5
données manquantes	1503	8	179	63	5	15	0	167	31	5
Age lors du début de la consommation régulière										
moyenne	22.1	22.8	22.4	24.2	21.5	27.2	22.0	16.2	17.1	27.4
écart-type	8.1	3.9	5.6	6.8	8.0	6.3	.	2.7	4.4	12.1
1er quartile	17.0	20.0	18.0	18.0	16.0	22.0	22.0	15.0	14.0	18.0
valeur médiane	20.0	23.0	21.0	23.0	20.0	25.0	22.0	16.0	16.0	24.0
3e quartile	25.0	26.0	25.0	28.0	21.0	32.0	22.0	17.0	20.0	34.0
N*	821	13	266	154	11	13	1	300	19	5
données manquantes	1480	7	199	78	6	11	0	190	29	5
Age lors du début de la consommation problématique										
moyenne	30.5	21.9	23.3	25.2	22.8	34.0	24.0	17.0	18.2	31.0
écart-type	11.4	3.0	5.9	7.2	8.1	4.4	.	3.4	5.6	4.2
1er quartile	20.0	20.0	19.0	20.0	18.0	32.0	24.0	15.0	14.5	28.0
valeur médiane	29.0	21.0	22.0	24.0	20.0	35.0	24.0	16.0	17.0	31.0
3e quartile	40.0	23.0	26.0	30.0	26.0	35.0	24.0	17.0	20.0	34.0
N*	635	9	159	119	10	5	1	202	12	2
données manquantes	1666	11	306	113	7	19	0	288	36	8
Période de latence (en années)**										
moyenne	26.2	9.6	9.5	6.1	6.6	13.0	.	5.8	14.4	14.0
écart-type	13.4	10.4	8.6	5.3	7.9	0.0	.	5.9	18.0	12.5
1er quartile	16.1	2.3	2.0	2.0	0.9	13.0	.	1.9	3.0	0.0
valeur médiane	26.1	6.1	7.4	4.6	3.1	13.0	.	3.7	5.5	17.6
3e quartile	34.9	16.9	14.9	9.9	9.9	13.0	.	7.9	13.1	24.3
N*	347	4	50	86	10	2	0	237	9	3
données manquantes	399	0	14	18	2	3	0	82	13	3

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1b Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2006), femmes

Patientes: principale substance posant problème										
Femmes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation										
moyenne	17.5	21.5	21.2	19.4	19.0	21.3	.	14.6	17.7	19.6
écart-type	6.3	5.6	7.4	4.5	2.8	9.3	.	3.1	7.4	13.6
1er quartile	15.0	17.0	16.0	16.0	17.0	14.0	.	14.0	12.0	12.0
valeur médiane	17.0	20.0	19.0	18.0	19.0	19.0	.	14.0	16.0	13.5
3e quartile	19.0	26.0	25.0	22.0	21.0	27.0	.	15.0	20.0	27.5
N*	280	6	82	54	2	10	0	73	15	4
données manquantes	633	3	51	20	1	4	0	39	26	7
Age lors du début de la consommation régulière										
moyenne	26.7	22.2	22.2	20.5	19.5	23.8	.	16.1	18.1	23.6
écart-type	11.3	6.0	7.1	5.3	2.1	12.1	.	3.7	7.2	13.2
1er quartile	18.0	17.0	18.0	17.0	18.0	15.0	.	15.0	13.0	14.0
valeur médiane	23.0	21.0	20.0	19.0	19.5	20.5	.	15.0	16.0	15.0
3e quartile	34.0	28.0	25.0	23.0	21.0	27.0	.	16.0	20.0	36.0
N*	310	6	81	53	2	10	0	70	17	5
données manquantes	603	3	52	21	1	4	0	42	24	6
Age lors du début de la consommation problématique										
moyenne	33.9	22.5	23.0	23.7	21.0	17.7	.	16.0	18.7	36.0
écart-type	11.8	5.7	7.7	6.5	.	3.5	.	2.4	7.7	.
1er quartile	25.0	18.0	18.0	19.5	21.0	14.0	.	15.0	14.0	36.0
valeur médiane	34.0	21.5	20.0	21.5	21.0	18.0	.	16.0	17.0	36.0
3e quartile	42.0	28.0	25.0	26.0	21.0	21.0	.	17.0	20.0	36.0
N*	261	6	61	36	1	3	0	46	14	1
données manquantes	652	3	72	38	2	11	0	66	27	10
Période de latence (en années)**										
moyenne	46.3	2.5	5.3	4.9	1.1	12.3	.	5.2	21.3	15.7
écart-type	194.4	0.3	4.2	6.0	.	5.7	.	3.8	18.9	4.9
1er quartile	17.8	2.2	1.2	1.0	1.1	6.0	.	2.8	2.2	11.5
valeur médiane	28.4	2.5	4.4	3.0	1.1	14.0	.	4.0	28.0	14.4
3e quartile	35.7	2.7	8.0	5.2	1.1	17.0	.	7.3	38.7	21.1
N*	102	2	14	30	1	3	0	53	9	3
données manquantes	193	0	3	3	0	1	0	21	11	5

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1c Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2006), hommes & femmes

Patient-e-s: principale substance posant problème										
Hommes & femmes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation										
moyenne	16.6	21.7	20.7	21.5	19.4	22.1	22.0	14.9	16.7	19.2
écart-type	4.9	4.1	5.8	5.7	6.8	7.1	.	2.2	6.0	10.3
1er quartile	15.0	18.0	17.0	17.0	16.0	17.0	22.0	14.0	13.0	14.0
valeur médiane	16.0	22.0	19.0	20.0	17.5	22.0	22.0	15.0	15.0	15.0
3e quartile	18.0	25.0	23.0	25.0	20.0	25.0	22.0	16.0	19.5	16.0
N*	1'078	18	368	223	14	19	1	396	32	9
données manquantes	2'136	11	230	83	6	19	0	206	57	12
Age lors du début de la consommation régulière										
moyenne	23.4	22.6	22.4	23.2	21.2	25.7	22.0	16.2	17.6	25.5
écart-type	9.3	4.5	6.0	6.6	7.3	9.2	.	2.9	5.8	12.1
1er quartile	17.0	18.0	18.0	18.0	18.0	20.0	22.0	15.0	14.0	15.0
valeur médiane	20.0	23.0	21.0	22.0	20.0	24.0	22.0	16.0	16.0	21.0
3e quartile	27.0	26.0	25.0	27.0	21.0	32.0	22.0	17.0	20.0	36.0
N*	1'131	19	347	207	13	23	1	370	36	10
données manquantes	2'083	10	251	99	7	15	0	232	53	11
Age lors du début de la consommation problématique										
moyenne	31.5	22.1	23.2	24.8	22.6	27.9	24.0	16.8	18.5	32.7
écart-type	11.6	4.1	6.4	7.0	7.7	9.3	.	3.3	6.7	4.2
1er quartile	21.0	19.0	19.0	20.0	18.0	19.5	24.0	15.0	14.0	28.0
valeur médiane	30.0	21.0	21.0	23.0	20.0	30.0	24.0	16.0	17.0	34.0
3e quartile	40.0	26.0	25.5	30.0	26.0	35.0	24.0	17.0	20.0	36.0
N*	896	15	220	155	11	8	1	248	26	3
données manquantes	2'318	14	378	151	9	30	0	354	63	18
Période de latence (en années)**										
moyenne	30.8	7.3	8.6	5.8	6.1	12.6	.	5.7	17.8	14.8
écart-type	93.5	8.9	8.0	5.5	7.7	4.0	.	5.5	18.3	8.6
1er quartile	16.5	2.2	2.0	1.7	0.9	13.0	.	2.0	2.2	11.5
valeur médiane	27.0	2.7	6.9	4.0	2.8	13.0	.	3.8	7.0	16.0
3e quartile	35.4	9.4	13.2	8.6	9.9	14.0	.	7.9	38.7	21.1
N*	449	6	64	116	11	5	0	290	18	6
données manquantes	592	0	17	21	2	4	0	103	24	8

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2a Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2006), hommes

Patients: problème principal			
Hommes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Age lors de la première apparition			
moyenne	31.4	.	34.0
écart-type	9.9	.	8.5
1er quartile	25.0	.	28.0
valeur médiane	29.5	.	34.0
3e quartile	40.0	.	40.0
N*	26	0	2
données manquantes	38	2	23
Age lors du début de l'apparition régulière			
moyenne	32.0	.	30.7
écart-type	9.2	.	8.3
1er quartile	27.0	.	24.0
valeur médiane	30.5	.	28.0
3e quartile	40.0	.	40.0
N*	28	0	3
données manquantes	36	2	22
Age lors du début de l'apparition problématique			
moyenne	32.4	.	33.3
écart-type	9.2	.	7.6
1er quartile	27.0	.	27.0
valeur médiane	31.0	.	34.5
3e quartile	40.0	.	39.5
N*	27	0	4
données manquantes	37	2	21
Période de latence (en années)**			
moyenne	3.9	.	6.2
écart-type	3.0	.	7.2
1er quartile	1.7	.	1.1
valeur médiane	3.0	.	6.2
3e quartile	5.7	.	11.4
N*	25	0	2
données manquantes	39	2	23

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2b Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2006), femmes

Patientes: problème principal			
Femmes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Age lors de la première apparition			
moyenne	28.3	17.3	28.2
écart-type	6.0	3.9	17.7
1er quartile	22.0	15.0	16.0
valeur médiane	29.0	16.0	40.0
3e quartile	34.0	18.0	40.0
N*	3	17	5
<i>données manquantes</i>	8	20	17
Age lors du début de l'apparition régulière			
moyenne	29.3	18.1	31.3
écart-type	6.4	4.3	12.4
1er quartile	22.0	14.5	18.0
valeur médiane	32.0	17.0	32.5
3e quartile	34.0	21.0	42.0
N*	3	16	6
<i>données manquantes</i>	8	21	16
Age lors du début de l'apparition problématique			
moyenne	29.3	18.4	26.2
écart-type	6.4	4.7	12.2
1er quartile	22.0	15.0	18.0
valeur médiane	32.0	17.0	22.5
3e quartile	34.0	24.0	40.0
N*	3	15	6
<i>données manquantes</i>	8	22	16
Période de latence (en années)**			
moyenne	2.1	8.2	12.1
écart-type	2.0	7.4	10.0
1er quartile	0.5	3.0	6.1
valeur médiane	1.5	4.9	10.0
3e quartile	4.4	10.9	18.2
N*	3	17	4
<i>données manquantes</i>	8	20	18

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2c Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2006), hommes & femmes

Patients: problème principal			
Hommes & femmes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Age lors de la première apparition			
moyenne	31.1	17.3	29.9
écart-type	9.5	3.9	15.1
1er quartile	25.0	15.0	16.0
valeur médiane	29.0	16.0	40.0
3e quartile	40.0	18.0	40.0
N*	29	17	7
<i>données manquantes</i>	46	22	40
Age lors du début de l'apparition régulière			
moyenne	31.8	18.1	31.1
écart-type	8.9	4.3	10.7
1er quartile	27.0	14.5	24.0
valeur médiane	31.0	17.0	28.0
3e quartile	40.0	21.0	40.0
N*	31	16	9
<i>données manquantes</i>	44	23	38
Age lors du début de l'apparition problématique			
moyenne	32.1	18.4	29.0
écart-type	8.9	4.7	10.8
1er quartile	27.0	15.0	20.0
valeur médiane	31.5	17.0	27.5
3e quartile	38.0	24.0	40.0
N*	30	15	10
<i>données manquantes</i>	45	24	37
Période de latence (en années)**			
moyenne	3.7	8.2	10.2
écart-type	3.0	7.4	8.9
1er quartile	1.5	3.0	2.4
valeur médiane	2.8	4.9	10.0
3e quartile	5.3	10.9	11.4
N*	28	17	6
<i>données manquantes</i>	47	22	41

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T17 Mode d'administration de la principale substance posant problème au cours des 6 derniers mois avant l'admission (2006)

Patient-e-s: principale substance posant problème															
Mode d'administration*	Héroïne			Cocaïne			Amphétamines			Cannabis			Benzodiazépines		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
injection	29.4	39.7	31.9	8.9	22.2	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	7.7
fumée/inhalation	42.4	29.3	39.1	16.3	22.2	17.9	0.0	0.0	0.0	99.3	100.0	99.4	0.0	0.0	0.0
ingestion (manger/boire)	1.1	0.0	0.9	0.8	0.0	0.6	20.0	100.0	33.3	0.7	0.0	0.6	90.0	66.7	84.6
sniff	26.6	31.0	27.7	74.0	55.6	69.0	80.0	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	7.7
autre	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	177	58	235	123	45	168	5	1	6	283	63	346	10	3	13
données manquantes	245	51	296	106	29	135	4	1	5	207	49	256	10	10	20

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T18 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 6 derniers mois avant l'admission des injections, échange de matériel d'injection au cours des 6 derniers mois avant l'admission et âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2006)

	Patient-e-s: principale substance posant problème												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Injections au cours de la vie*																
oui	10.3	9.9	10.2	68.3	60.0	66.3	36.2	47.7	38.8	25.9	33.3	27.2	22.9	20.8	22.3	639
non	89.7	90.1	89.8	31.7	40.0	33.7	63.8	52.3	61.2	74.1	66.7	72.8	77.1	79.2	77.7	2'221
N**	1'222	473	1'695	290	90	380	152	44	196	344	72	416	2'104	756	2'860	2'860
données manquantes	1'079	440	1'519	195	52	247	80	30	110	146	40	186	1'617	640	2'257	2'257
Injections au cours des 6 derniers mois*																
oui	3.7	4.7	4.0	40.8	42.9	41.3	26.8	45.5	31.1	24.3	30.1	25.4	13.8	14.7	14.1	397
non	96.3	95.3	96.0	59.2	57.1	58.7	73.2	54.5	68.9	75.7	69.9	74.6	86.2	85.3	85.9	2'428
N**	1'212	472	1'684	267	91	358	149	44	193	345	73	418	2'068	757	2'825	2'825
données manquantes	1'089	441	1'530	218	51	269	83	30	113	145	39	184	1'653	639	2'292	2'292
Injections au cours des 30 derniers jours*																
oui	1.1	0.6	1.0	38.9	35.6	38.1	11.8	24.4	14.6	0.0	0.0	0.0	6.1	5.5	6.0	182
non	98.9	99.4	99.0	61.1	64.4	61.9	88.2	75.6	85.4	100.0	100.0	100.0	93.9	94.5	94.0	2'871
N**	1'358	505	1'863	262	87	349	153	45	198	346	76	422	2'238	815	3'053	3'053
données manquantes	943	408	1'351	223	55	278	79	29	108	144	36	180	1'483	581	2'064	2'064
Echange de matériel d'injection au cours des 6 derniers mois***																
oui	2.7	0.0	1.8	9.4	14.3	10.3	3.2	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	3.6	2.8	3.4	10
non	97.3	100.0	98.2	90.6	85.7	89.7	96.8	100.0	97.6	100.0	100.0	100.0	96.4	97.2	96.6	283
N**	37	18	55	64	14	78	31	11	42	83	22	105	221	72	293	293
données manquantes	5	3	8	25	15	40	5	4	9	1	0	1	38	23	61	61
Age lors de la première injection****																
jusqu'à 14 ans	5.7	10.0	6.3	3.4	11.8	5.3	9.1	10.0	9.4	0.0	0.0	0.0	4.5	10.2	5.7	15
de 15 à 16 ans	9.4	20.0	11.1	6.8	14.7	8.6	13.6	0.0	9.4	25.0	50.0	30.0	9.4	15.3	10.7	28
de 17 à 18 ans	26.4	30.0	27.0	23.1	20.6	22.5	27.3	40.0	31.3	25.0	0.0	20.0	24.3	25.4	24.5	64
de 19 à 20 ans	13.2	20.0	14.3	17.9	23.5	19.2	9.1	10.0	9.4	0.0	0.0	0.0	14.9	18.6	15.7	41
de 21 à 25 ans	26.4	20.0	25.4	28.2	17.6	25.8	31.8	30.0	31.3	37.5	0.0	30.0	28.2	20.3	26.4	69
de 26 à 30 ans	9.4	0.0	7.9	14.5	11.8	13.9	0.0	10.0	3.1	12.5	0.0	10.0	11.9	8.5	11.1	29
de 31 à 39 ans	5.7	0.0	4.8	4.3	0.0	3.3	9.1	0.0	6.3	0.0	50.0	10.0	5.0	1.7	4.2	11
dès 40 ans	3.8	0.0	3.2	1.7	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.5	4
N**	53	10	63	117	34	151	22	10	32	8	2	10	202	59	261	261
données manquantes	73	37	110	81	20	101	33	11	44	81	22	103	280	98	378	378

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours des 6 derniers mois. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours de leur vie. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2006), hommes

Hommes

Patients: principale substance posant problème										
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*										
alcool		27.8	33.3	40.9	41.7	35.0	0.0	23.6	29.4	11.1
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.6		6.1	3.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
héroïne	2.8	44.4	2.8	15.8	0.0	50.0	0.0	2.2	0.0	22.2
méthadone	1.5	27.8	28.4	6.4	0.0	35.0	0.0	0.3	0.0	0.0
autres opiacés	0.2	0.0	3.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
cocaïne	6.9	44.4	43.0	0.5	25.0	20.0	0.0	8.8	0.0	11.1
crack, freebase	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
amphétamines	0.6	0.0	2.5	3.9	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.7	5.6	5.2	10.3	25.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0
autres stimulants	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
benzodiazépines	3.2	27.8	15.2	5.9	0.0	10.0	0.0	0.8	0.0	11.1
autres somnifères et tranquillisants	1.0	0.0	1.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.3	5.6	4.1	1.5	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	5.6	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0
substances volatiles	0.1	0.0	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
cannabis	9.2	44.4	40.2	37.9	41.7	20.0	0.0		11.8	11.1
tabac	27.6	38.9	38.6	32.0	41.7	35.0	0.0	26.9		11.1
autres substances	0.6	0.0	1.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.5	5.9	
jeu pathologique	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1
troubles alimentaires	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres troubles assimilables à une addiction	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	59.7	11.1	17.1	20.2	8.3	20.0	0.0	52.2	70.6	44.4
N**	1'267	18	363	203	12	20	0	364	17	9
<i>données manquantes</i>	<i>1'034</i>	<i>2</i>	<i>102</i>	<i>29</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>126</i>	<i>31</i>	<i>1</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2006), femmes

Femmes

Patientes: principale substance posant problème										
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*										
alcool		0.0	31.0	47.5	100.0	23.1	0.0	25.0	8.3	0.0
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.0		5.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
héroïne	1.7	0.0	4.0	16.9	0.0	7.7	0.0	2.5	0.0	0.0
méthadone	2.1	14.3	18.0	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opiacés	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne	3.9	14.3	33.0	0.0	0.0	15.4	0.0	13.8	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	2.0	3.4	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.4	42.9	2.0	18.6	100.0	7.7	0.0	2.5	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.8	28.6	6.0	16.9	0.0	7.7	0.0	10.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	8.7	0.0	26.0	8.5	0.0	7.7	0.0	2.5	0.0	10.0
autres somnifères et tranquillisants	1.4	0.0	3.0	3.4	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
LSD	0.4	0.0	7.0	5.1	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
cannabis	7.0	28.6	29.0	47.5	0.0	23.1	0.0		8.3	0.0
tabac	27.3	0.0	34.0	33.9	0.0	46.2	0.0	38.8		10.0
autres substances	0.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	
jeu pathologique	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
troubles alimentaires	3.3	28.6	5.0	1.7	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0
autres troubles assimilables à une addiction	1.2	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	57.6	28.6	20.0	11.9	0.0	38.5	0.0	41.3	83.3	80.0
N**	483	7	100	59	1	13	0	80	12	10
<i>données manquantes</i>	<i>430</i>	<i>2</i>	<i>33</i>	<i>15</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>32</i>	<i>29</i>	<i>1</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2006), hommes & femmes

Hommes & femmes

	Patient-e-s: principale substance posant problème									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*										
alcool		20.0	32.8	42.4	46.2	30.3	0.0	23.9	20.7	5.3
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.4		5.8	3.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
héroïne	2.5	32.0	3.0	16.0	0.0	33.3	0.0	2.3	0.0	10.5
méthadone	1.7	24.0	26.1	7.3	0.0	21.2	0.0	0.2	0.0	0.0
autres opiacés	0.3	0.0	2.6	0.4	0.0	3.0	0.0	0.2	0.0	0.0
cocaïne	6.1	36.0	40.8	0.4	23.1	18.2	0.0	9.7	0.0	5.3
crack, freebase	0.0	0.0	1.7	0.8	0.0	3.0	0.0	0.2	0.0	0.0
amphétamines	0.5	12.0	2.4	7.3	7.7	3.0	0.0	3.2	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.7	12.0	5.4	11.8	23.1	3.0	0.0	5.6	0.0	0.0
autres stimulants	0.1	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.1	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
benzodiazépines	4.7	20.0	17.5	6.5	0.0	9.1	0.0	1.1	0.0	10.5
autres somnifères et tranquillisants	1.1	0.0	1.7	1.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
LSD	0.3	4.0	4.8	2.3	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	4.0	0.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
substances volatiles	0.1	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
cannabis	8.6	40.0	37.8	40.1	38.5	21.2	0.0		10.3	5.3
tabac	27.5	28.0	37.6	32.4	38.5	39.4	0.0	29.1		10.5
autres substances	0.5	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.9	3.4	
jeu pathologique	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3
troubles alimentaires	0.9	8.0	1.1	0.8	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0
autres troubles assimilables à une addiction	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	59.1	16.0	17.7	18.3	7.7	27.3	0.0	50.2	75.9	63.2
N**	1'750	25	463	262	13	33	0	444	29	19
données manquantes	1'464	4	135	44	7	5	1	158	60	2

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2006), hommes

Hommes

Patients: problème principal			
	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
	%	%	%
Autres problèmes*			
alcool	7.7	0.0	12.5
coktails (héroïne et cocaïne)	0.0	0.0	0.0
héroïne	0.0	0.0	12.5
méthadone	0.0	0.0	0.0
autres opiacés	0.0	0.0	0.0
cocaïne	0.0	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0
cannabis	2.6	0.0	0.0
tabac	12.8	0.0	37.5
autres substances	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique		0.0	0.0
troubles alimentaires	0.0		0.0
autres troubles assimilables à une addiction	2.6	0.0	
aucun autre problème addictif	74.4	0.0	50.0
N**	39	0	8
<i>données manquantes</i>	25	2	17

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2006), femmes

Femmes

Patientes: problème principal			
	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
	%	%	%
Autres problèmes*			
alcool	14.3	13.6	10.0
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.0	0.0	0.0
héroïne	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0
autres opiacés	0.0	0.0	0.0
cocaïne	0.0	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0
cannabis	0.0	0.0	0.0
tabac	0.0	4.5	10.0
autres substances	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique		0.0	0.0
troubles alimentaires	14.3		20.0
autres troubles assimilables à une addiction	0.0	0.0	
aucun autre problème addictif	85.7	81.8	60.0
N**	7	22	10
<i>données manquantes</i>	4	15	12

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2006), hommes & femmes

Hommes & femmes

	Patient-e-s: problème principal		
	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
	%	%	%
Autres problèmes*			
alcool	8.7	13.6	11.1
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.0	0.0	0.0
héroïne	0.0	0.0	5.6
méthadone	0.0	0.0	0.0
autres opiacés	0.0	0.0	0.0
cocaïne	0.0	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0
cannabis	2.2	0.0	0.0
tabac	10.9	4.5	22.2
autres substances	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique		0.0	0.0
troubles alimentaires	2.2		11.1
autres troubles assimilables à une addiction	2.2	0.0	
aucun autre problème addictif	76.1	81.8	55.6
N**	46	22	18
<i>données manquantes</i>	29	17	29

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T20 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2006)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence de la consommation d'alcool*																
jamais	11.2	9.4	10.7	13.0	22.2	15.2	10.4	8.3	9.9	15.4	20.4	16.3	12.3	12.2	12.3	310
1 fois par mois ou moins	3.4	3.7	3.5	15.5	15.9	15.6	13.6	11.1	13.0	14.5	24.1	16.3	7.2	8.2	7.5	189
2 à 4 fois par mois	6.1	5.8	6.0	20.3	28.6	22.2	20.0	33.3	23.0	41.2	37.0	40.4	13.7	12.8	13.5	340
2 à 3 fois par semaine	18.2	18.9	18.4	21.3	15.9	20.0	34.4	25.0	32.3	19.3	14.8	18.4	19.6	18.6	19.4	489
4 fois ou plus par semaine	61.0	62.2	61.3	30.0	17.5	27.0	21.6	22.2	21.7	9.6	3.7	8.5	47.2	48.1	47.4	1'199
N**	1'239	481	1'720	207	63	270	125	36	161	228	54	282	1'856	671	2'527	2'527
<i>données manquantes</i>	1'062	432	1'494	278	79	357	107	38	145	262	58	320	1'865	725	2'590	2'590
Nbre de boissons standards par jour***																
1 ou 2	7.2	8.7	7.6	43.9	66.7	48.7	41.8	32.1	39.7	50.3	59.5	52.0	19.6	20.9	19.9	395
3 ou 4	18.2	21.7	19.2	37.4	14.3	32.5	35.7	32.1	34.9	31.7	29.7	31.4	23.3	21.7	22.8	453
5 ou 6	21.9	21.2	21.7	10.3	14.3	11.2	12.2	28.6	15.9	9.6	8.1	9.3	18.2	19.8	18.6	369
7 à 9	20.6	23.0	21.3	3.9	2.4	3.6	6.1	7.1	6.3	5.4	0.0	4.4	15.6	17.9	16.2	321
10 ou plus	32.1	25.5	30.3	4.5	2.4	4.1	4.1	0.0	3.2	3.0	2.7	2.9	23.4	19.8	22.4	445
N**	1'005	392	1'397	155	42	197	98	28	126	167	37	204	1'462	521	1'983	1'983
<i>données manquantes</i>	1'296	521	1'817	330	100	430	134	46	180	323	75	398	2'259	875	3'134	3'134
Fréquence de fortes consom. d'alcool***																
jamais	12.9	15.2	13.5	43.5	54.0	46.0	39.0	37.0	38.6	53.7	72.7	57.3	24.3	27.6	25.2	519
moins d'une fois par mois	10.5	11.1	10.6	16.8	22.0	18.0	20.0	22.2	20.5	22.3	13.6	20.7	13.4	12.8	13.2	273
1 fois par mois	11.0	10.8	10.9	13.0	4.0	10.9	14.0	22.2	15.7	12.2	11.4	12.1	11.5	10.8	11.3	234
1 fois par semaine	23.5	21.1	22.8	19.9	16.0	19.0	22.0	7.4	18.9	9.0	2.3	7.8	20.7	17.3	19.8	409
presque chaque jour	42.2	41.9	42.1	6.8	4.0	6.2	5.0	11.1	6.3	2.7	0.0	2.2	30.1	31.5	30.4	628
N**	1'031	389	1'420	161	50	211	100	27	127	188	44	232	1'524	539	2'063	2'063
<i>données manquantes</i>	1'270	524	1'794	324	92	416	132	47	179	302	68	370	2'197	857	3'054	3'054

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation d'alcool. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**T21 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission,
selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2006)**

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence de la consommation de tabac*																
jamais	30.0	40.8	33.2	5.2	4.8	5.1	13.4	12.5	13.2	21.2	13.5	19.8	22.9	29.8	24.8	450
1 jour par semaine ou moins	1.5	0.7	1.3	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	3.1	5.8	3.6	1.5	1.2	1.4	26
2 à 3 jours par semaine	1.5	0.3	1.2	1.0	1.6	1.2	2.1	0.0	1.6	3.5	1.9	3.2	1.8	0.8	1.5	28
4 à 6 jours par semaine	1.3	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.9	1.8	1.0	1.0	1.0	18
1 fois par jour	1.5	0.3	1.2	1.0	4.8	2.0	2.1	6.3	3.1	2.7	3.8	2.9	1.6	1.6	1.6	29
plusieurs fois par jour	64.1	56.5	61.8	91.7	88.7	90.9	82.5	81.3	82.2	67.7	73.1	68.7	71.2	65.7	69.6	1'264
N**	710	299	1'009	192	62	254	97	32	129	226	52	278	1'308	507	1'815	1'815
<i>données manquantes</i>	<i>1'591</i>	<i>614</i>	<i>2'205</i>	<i>293</i>	<i>80</i>	<i>373</i>	<i>135</i>	<i>42</i>	<i>177</i>	<i>264</i>	<i>60</i>	<i>324</i>	<i>2'413</i>	<i>889</i>	<i>3'302</i>	<i>3'302</i>
Nombre de cigarettes par jour***																
0 à 10	14.4	15.9	14.7	12.4	13.0	12.6	24.3	23.8	24.2	45.0	54.1	46.9	19.9	22.3	20.5	231
11 à 20	33.4	37.2	34.4	40.0	47.8	41.9	43.2	66.7	48.4	47.1	35.1	44.6	38.6	40.9	39.2	441
21 à 30	33.2	27.6	31.8	31.0	23.9	29.3	24.3	9.5	21.1	5.7	5.4	5.6	27.2	23.0	26.1	294
31 ou plus	19.1	19.3	19.1	16.6	15.2	16.2	8.1	0.0	6.3	2.1	5.4	2.8	14.3	13.7	14.1	159
N**	425	145	570	145	46	191	74	21	95	140	37	177	834	291	1'125	1'125
<i>données manquantes</i>	<i>72</i>	<i>32</i>	<i>104</i>	<i>37</i>	<i>13</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>7</i>	<i>17</i>	<i>38</i>	<i>8</i>	<i>46</i>	<i>175</i>	<i>65</i>	<i>240</i>	<i>240</i>

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T22a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2006), hommes

Patient-e-s: principale substance posant problème										
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Objectif de consommation*										
abstinence définitive	39.2	60.0	71.4	82.5	80.0	37.5	0.0	41.2	60.0	100.0
abstinence limitée dans le temps	20.5	0.0	2.3	4.4	0.0	6.3	0.0	11.0	0.0	0.0
consommation contrôlée	23.1	20.0	9.9	4.4	0.0	37.5	0.0	24.2	20.0	0.0
aucune limitation envisagée	2.5	10.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0
pas déterminé pour l'instant	14.1	10.0	13.2	8.8	20.0	12.5	100.0	20.9	20.0	0.0
autre	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	1'147	10	304	137	5	16	1	182	5	4
<i>données manquantes</i>	<i>1'154</i>	<i>10</i>	<i>161</i>	<i>95</i>	<i>12</i>	<i>8</i>	<i>0</i>	<i>308</i>	<i>43</i>	<i>6</i>

T22b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2006), femmes

Objectif de consommation*										
abstinence définitive	40.4	50.0	81.7	65.8	0.0	70.0	0.0	50.0	70.0	80.0
abstinence limitée dans le temps	13.9	0.0	1.4	2.6	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	0.0
consommation contrôlée	33.9	0.0	9.9	13.2	0.0	20.0	0.0	7.1	0.0	20.0
aucune limitation envisagée	1.2	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	10.0	0.0
pas déterminé pour l'instant	10.4	50.0	5.6	18.4	0.0	10.0	0.0	21.4	20.0	0.0
autre	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0
N**	431	2	71	38	0	10	0	28	10	5
<i>données manquantes</i>	<i>482</i>	<i>7</i>	<i>62</i>	<i>36</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>84</i>	<i>31</i>	<i>6</i>

T22c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2006), hommes & femmes

Objectif de consommation*										
abstinence définitive	39.5	58.3	73.3	78.9	80.0	50.0	0.0	42.4	66.7	88.9
abstinence limitée dans le temps	18.7	0.0	2.1	4.0	0.0	3.8	0.0	11.0	0.0	0.0
consommation contrôlée	26.0	16.7	9.9	6.3	0.0	30.8	0.0	21.9	6.7	11.1
aucune limitation envisagée	2.2	8.3	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	6.7	0.0
pas déterminé pour l'instant	13.1	16.7	11.7	10.9	20.0	11.5	100.0	21.0	20.0	0.0
autres	0.4	0.0	0.8	0.0	0.0	3.8	0.0	0.5	0.0	0.0
N**	1'578	12	375	175	5	26	1	210	15	9
<i>données manquantes</i>	<i>1'636</i>	<i>17</i>	<i>223</i>	<i>131</i>	<i>15</i>	<i>12</i>	<i>0</i>	<i>392</i>	<i>74</i>	<i>12</i>

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T23 Sexe et âge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2006)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Sexe*																			
hommes			70.0			75.6			72.4			81.8			22.3			61.0	2'449
femmes			30.0			22.1			27.6			17.4			77.7			37.4	1'503
sexe pas connu			0.0			2.3			0.0			0.8			0.0			1.6	63
N**	1'341	575	1'916	232	68	307	110	42	152	315	67	385	157	546	703	2'449	1'503	4'015	4'015
Age (en années)*																			
jusqu'à 14	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.6	2.7	2.7	0.8	1.2	0.6	0.8	0.6	25
15-19	1.3	0.7	1.1	1.3	11.9	3.7	8.2	16.7	10.5	53.8	63.1	55.4	12.8	3.9	5.9	9.7	6.4	8.5	327
20-24	3.7	2.5	3.3	11.0	28.4	14.9	25.5	31.0	27.0	20.2	12.3	18.8	4.7	4.1	4.2	7.9	6.8	7.5	290
25-29	7.5	3.7	6.4	19.7	14.9	18.6	11.8	23.8	15.1	10.3	6.2	9.5	4.7	6.0	5.7	9.3	6.4	8.2	317
30-34	10.4	8.2	9.7	21.1	16.4	20.0	17.3	7.1	14.5	6.4	6.2	6.4	4.7	6.6	6.2	10.8	8.0	9.7	376
35-39	13.0	11.4	12.5	29.8	16.4	26.8	20.0	16.7	19.1	3.5	4.6	3.7	14.8	13.5	13.7	13.8	11.7	13.0	502
40-44	15.3	16.7	15.7	11.8	9.0	11.2	11.8	4.8	9.9	2.2	3.1	2.4	6.0	15.4	13.3	12.9	14.6	13.5	523
45-49	15.5	18.3	16.3	3.9	3.0	3.7	3.6	0.0	2.6	0.6	0.0	0.5	15.4	17.2	16.8	11.6	14.8	12.8	494
50-54	13.3	14.6	13.7	0.9	0.0	0.7	1.8	0.0	1.3	0.3	0.0	0.3	10.7	14.0	13.3	9.2	12.1	10.3	397
55-59	9.1	10.7	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	7.0	6.3	6.0	7.6	6.6	254
60-64	6.0	6.6	6.2	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4.7	4.1	4.1	5.0	4.4	171
65-69	3.2	4.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	6.0	2.9	3.6	2.4	3.5	2.8	107
70-74	1.2	0.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	2.5	3.2	1.3	1.3	1.3	50
75 et plus	0.3	1.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	1.4	2.4	0.6	1.0	0.8	29
N**	1'327	563	1'890	228	67	295	110	42	152	312	65	377	149	513	662	2'413	1'449	3'862	3'862
données manquantes	14	12	26	4	1	12	0	0	0	3	2	8	8	33	41	36	54	153	153
Age (valeurs centrales)																			
moyenne	44.6	46.9	45.3	33.7	29.3	32.7	31.1	26.5	29.8	22.0	20.5	21.8	43.9	44.4	44.3	39.6	42.6	40.7	
écart-type	12.1	11.6	12.0	7.2	8.1	7.7	8.4	7.4	8.4	7.4	7.0	7.3	18.6	13.4	14.7	14.1	14.1	14.2	
1er quartile	36.0	39.1	36.9	27.7	21.7	26.3	23.8	20.8	22.6	17.2	16.1	17.0	30.8	36.0	35.3	28.6	32.6	30.1	
valeur médiane	44.6	46.7	45.3	34.1	29.3	33.3	31.1	25.9	28.0	18.7	17.4	18.5	44.9	44.8	44.9	39.1	43.6	41.0	
3e quartile	52.9	54.6	53.5	38.1	37.2	37.9	37.5	32.3	36.4	24.1	21.3	24.0	54.3	52.3	52.6	49.3	52.2	50.4	
N**	1'327	563	1'890	228	67	295	110	42	152	312	65	377	149	513	662	2'413	1'449	3'862	
données manquantes	14	12	26	4	1	12	0	0	0	3	2	8	8	33	41	36	54	153	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T24 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2006)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Etat civil*																			
célibataire	38.1	27.2	34.8	74.1	67.2	72.6	71.0	78.6	73.2	93.0	92.3	93.0	38.8	21.5	25.2	51.4	33.7	45.0	1'686
marié-e	35.5	28.9	33.5	10.5	13.1	10.8	18.7	4.8	14.8	4.3	3.1	4.1	47.0	59.0	56.5	28.2	37.8	31.6	1'182
séparé-e	5.5	7.2	6.0	3.6	1.6	3.8	1.9	4.8	2.7	0.3	1.5	0.5	4.5	4.1	4.1	4.6	5.1	5.0	186
divorcé-e	19.1	30.8	22.5	10.0	13.1	10.4	8.4	9.5	8.7	2.3	3.1	2.4	8.2	14.2	12.9	14.3	19.8	16.1	604
veuf/veuve	1.7	5.8	3.0	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.6	0.8	1.2	3.0	1.9	70
partenariat enregistré	0.2	0.2	0.2	1.4	4.9	2.1	0.0	2.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.3	0.7	0.4	15
N**	1'258	530	1'788	220	61	288	107	42	149	302	65	370	134	493	627	2'300	1'381	3'743	3'743
données manquantes	83	45	128	12	7	19	3	0	3	13	2	15	23	53	76	149	122	272	272
Degré d'urbanisation*																			
grands centres urbains	14.6	20.2	16.3	1.0	0.0	0.8	1.0	8.3	3.0	0.3	1.7	0.6	14.8	12.6	13.1	9.7	13.1	11.0	389
périphérie des grands centres	15.2	16.4	15.5	1.5	3.3	1.9	2.1	0.0	1.5	2.7	3.4	2.9	14.8	12.8	13.3	11.3	13.2	12.0	425
villes de moyenne importance	15.4	15.2	15.4	29.4	45.0	33.0	27.8	30.6	28.6	25.1	25.4	25.1	12.0	18.8	17.3	18.7	19.9	19.1	678
petites villes	29.8	25.9	28.6	44.6	30.0	41.3	38.1	38.9	38.3	34.4	35.6	34.6	32.4	25.7	27.1	33.9	28.2	31.7	1'123
campagne	25.0	22.2	24.2	23.5	21.7	23.1	30.9	22.2	28.6	37.5	33.9	36.9	26.1	30.1	29.2	26.5	25.6	26.2	926
N**	1'188	499	1'687	204	60	264	97	36	133	291	59	350	142	499	641	2'197	1'344	3'541	3'541
données manquantes	153	76	229	28	8	43	13	6	19	24	8	35	15	47	62	252	159	474	474

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T25 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2006)

Type de ménage*	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
seul-e en ménage	39.8	37.1	39.0	43.3	22.0	37.9	30.8	27.0	29.7	14.9	6.3	13.5	12.0	11.6	11.7	34.4	23.2	30.2	855
avec un ou les parents	6.6	2.8	5.5	11.7	8.0	11.0	19.8	18.9	19.5	62.9	60.3	62.5	21.7	5.7	9.0	18.2	9.6	14.9	421
avec enfant(s), sans partenaire	2.4	13.2	5.5	0.0	2.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	0.6	7.6	14.4	13.0	2.0	11.6	5.5	156
avec partenaire, sans enfant	25.2	26.7	25.6	17.0	36.0	20.7	24.2	18.9	22.7	6.5	9.5	7.0	25.0	22.9	23.4	20.3	25.5	22.1	625
avec partenaire et enfant(s)	19.3	13.5	17.7	9.4	14.0	10.1	9.9	0.0	7.0	2.5	6.3	3.2	28.3	42.5	39.6	16.0	22.8	18.5	522
avec d'autres proches	1.9	0.8	1.6	1.8	8.0	3.1	4.4	5.4	4.7	4.7	4.8	4.7	1.1	1.1	1.1	2.5	1.7	2.2	63
avec des amis (colocation)	1.1	2.8	1.6	3.5	2.0	3.1	2.2	16.2	6.3	2.2	0.0	1.8	2.2	1.1	1.3	1.6	2.4	1.9	55
autre	3.6	3.1	3.5	13.5	8.0	13.2	8.8	13.5	10.2	5.8	11.1	6.7	2.2	0.6	0.9	5.0	3.2	4.6	131
N**	884	356	1'240	171	50	227	91	37	128	275	63	341	92	353	445	1'742	1'029	2'828	2'828
données manquantes	457	219	676	61	18	80	19	5	24	40	4	44	65	193	258	707	474	1'187	1'187
Situation de domicile*																			
domicile fixe	94.5	95.5	94.8	82.9	80.8	81.6	92.2	83.8	89.8	94.4	89.7	93.6	92.7	97.7	96.6	93.1	94.9	93.6	2'739
sans domicile fixe	3.6	3.1	3.4	7.6	13.5	8.8	6.7	5.4	6.3	1.9	0.0	1.5	6.4	2.1	3.0	4.2	3.1	3.7	109
institution	1.9	1.3	1.8	9.4	5.8	9.6	1.1	10.8	3.9	3.7	10.3	4.9	0.9	0.3	0.4	2.7	1.9	2.7	79
N**	925	381	1'306	170	52	228	90	37	127	267	58	328	109	388	497	1'791	1'080	2'927	2'927
données manquantes	416	194	610	62	16	79	20	5	25	48	9	57	48	158	206	658	423	1'088	1'088
Type de relation de couple*																			
sans partenaire, seul-e	27.3	32.9	28.9	48.5	20.0	41.3	23.0	40.0	27.2	63.9	40.6	59.8	13.3	15.7	15.2	33.0	24.4	29.8	665
relations temporaires	4.9	5.7	5.2	10.4	8.0	9.5	6.6	5.0	6.2	7.7	15.6	9.0	8.0	2.2	3.4	6.6	5.4	6.3	140
partenaire fixe, vivant séparé	13.0	13.4	13.1	7.5	12.0	9.5	19.7	20.0	19.8	11.0	12.5	11.6	10.7	8.3	8.8	12.3	11.1	11.9	265
partenaire fixe, ménage commun	54.8	48.0	52.8	33.6	60.0	39.7	50.8	35.0	46.9	17.4	31.3	19.6	68.0	73.8	72.7	48.1	59.0	52.0	1'158
N**	730	298	1'028	134	50	189	61	20	81	155	32	189	75	313	388	1'334	847	2'228	2'228
données manquantes	611	277	888	98	18	118	49	22	71	160	35	196	82	233	315	1'115	656	1'787	1'787

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T26 Plus haute formation achevée, source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2006)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Plus haute formation achevée*																			
aucune form. achevée	4.1	6.9	4.9	7.4	5.8	7.0	2.5	3.4	2.7	9.6	22.2	11.9	4.2	5.9	5.5	5.5	7.2	6.1	147
scolarité obligatoire	14.7	21.8	16.7	28.2	50.0	33.5	29.6	34.5	30.9	58.2	57.4	58.1	23.6	18.1	19.2	24.7	25.3	24.9	599
scolarité complémentaire	1.1	4.0	1.9	1.8	5.8	2.8	3.7	6.9	4.5	1.6	5.6	2.3	1.4	3.0	2.6	1.8	3.9	2.5	61
apprentissage/école prof.	62.2	50.2	58.9	56.4	36.5	51.6	55.6	55.2	55.5	25.3	9.3	22.4	43.1	54.2	51.9	54.2	47.7	51.9	1'248
maturité/diplôme	2.7	6.3	3.7	2.5	1.9	2.3	0.0	0.0	0.0	3.2	5.6	3.6	4.2	6.6	6.1	2.5	6.7	4.0	96
école normale, pédagog.	0.9	2.0	1.2	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	4.8	4.1	0.6	2.6	1.3	31
form. profession. supérieure	7.7	4.6	6.8	1.2	0.0	0.9	6.2	0.0	4.5	1.6	0.0	1.3	8.3	3.7	4.7	5.5	3.4	4.8	115
école profession. supérieure	1.1	0.7	1.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	4.2	0.4	1.2	1.1	0.4	0.8	20
haute école spécialisée	1.7	1.3	1.6	0.6	0.0	0.5	2.5	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	2.8	1.1	1.5	1.3	0.8	1.1	27
université, haute école	3.8	2.3	3.4	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	2.2	3.2	2.8	2.1	2.5	61
N**	784	303	1'087	163	52	215	81	29	110	249	54	303	72	271	343	1'554	851	2'405	2'405
données manquantes	557	272	829	69	16	92	29	13	42	66	13	82	85	275	360	895	652	1'610	1'610
Source de revenu principale*																			
salaires	57.5	37.2	51.7	36.8	26.9	34.1	56.3	37.5	50.9	31.9	16.7	29.0	61.4	58.0	58.8	52.2	44.2	49.1	1'434
économies, épargne	0.3	0.8	0.4	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	2.6	0.3	0.8	0.7	0.5	0.6	17
rente (AVS, AI ou autre)	17.4	26.8	20.1	20.9	19.2	21.2	11.3	18.8	13.4	3.9	3.3	3.8	15.8	8.9	10.5	15.7	17.8	16.7	488
aide sociale	13.1	11.2	12.5	33.1	28.8	31.8	15.0	25.0	17.9	4.7	10.0	5.7	3.5	3.5	3.5	12.6	8.7	11.2	326
assurance-chômage	8.1	6.6	7.7	6.7	11.5	7.8	10.0	6.3	8.9	5.8	6.7	6.0	0.9	1.3	1.2	7.1	4.6	6.2	181
soutien du/de la partenaire	1.1	14.3	4.9	0.6	3.8	1.4	0.0	0.0	0.0	0.8	5.0	1.6	0.9	21.8	16.9	0.9	15.0	6.1	179
soutien parents/proches/amis	2.1	2.3	2.1	1.2	7.7	2.8	3.8	12.5	6.3	50.6	58.3	52.1	14.0	5.7	7.6	10.0	8.2	9.3	271
deal, combines	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.5	2.5	0.0	1.8	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	4
autres revenus illégaux	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
autre	0.3	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.9	0.8	0.0	0.6	0.9	0.5	0.6	0.5	0.8	0.7	20
N**	972	392	1'364	163	52	217	80	32	112	257	60	317	114	371	485	1'829	1'078	2'923	2'923
données manquantes	369	183	552	69	16	90	30	10	40	58	7	68	43	175	218	620	425	1'092	1'092
Taux d'activité principal*																			
activ. à plein temps (dès 70%)	54.2	23.6	45.6	35.2	19.6	31.3	56.6	20.6	46.2	27.7	13.1	24.8	63.4	35.5	41.9	48.7	27.7	40.8	1'095
activité à temps partiel	4.8	20.0	9.1	4.4	6.5	4.8	3.6	17.6	7.7	1.9	8.2	3.0	3.2	33.2	26.4	3.7	24.2	10.9	292
plusieurs activités occas.	2.3	2.1	2.3	0.6	6.5	1.9	1.2	0.0	0.9	1.9	0.0	1.8	0.0	0.3	0.2	1.8	1.3	1.7	45
en formation	2.3	2.1	2.3	0.6	4.3	1.4	3.6	20.6	8.5	47.6	57.4	49.2	14.0	6.1	7.9	10.4	8.5	9.5	256
sans activité prof.	20.4	35.2	24.6	23.9	26.1	25.0	14.5	17.6	15.4	4.5	6.6	4.8	15.1	18.5	17.7	18.5	25.7	21.8	584
sans travail, en quête d'emploi	13.2	14.0	13.4	25.8	32.6	27.4	19.3	20.6	19.7	12.4	6.6	11.5	2.2	1.9	2.0	13.1	9.0	11.6	311
sans travail, futur emploi garanti	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	5
autre	2.6	2.7	2.6	9.4	4.3	8.2	1.2	2.9	1.7	4.1	8.2	4.8	2.2	4.2	3.7	3.6	3.5	3.5	94
N**	858	335	1'193	159	46	208	83	34	117	267	61	331	93	313	406	1'689	943	2'682	2'682
données manquantes	483	240	723	73	22	99	27	8	35	48	6	54	64	233	297	760	560	1'333	1'333

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T27 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2006)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	30.6	44.9	34.7	59.5	59.1	59.5	31.4	47.4	35.7	19.5	12.5	18.5	17.3	20.3	19.7	31.7	35.4	33.7	562
apprenti-e, stagiaire	1.2	1.7	1.3	0.9	0.0	0.6	3.9	10.5	5.7	28.3	31.3	28.5	1.9	2.9	2.7	4.4	3.0	3.9	65
manœuvre, aide	3.4	4.3	3.7	7.8	6.8	7.4	5.9	5.3	5.7	1.8	0.0	1.5	0.0	3.9	3.1	3.7	4.1	3.7	62
ouvrier/ère formé-e sur le tas	5.1	4.3	4.9	5.2	6.8	5.5	7.8	5.3	7.1	1.8	6.3	2.3	3.8	4.3	4.2	5.3	4.2	4.8	80
ouvrier/ère formé-e (CFC)	13.5	6.4	11.5	12.9	11.4	12.3	7.8	5.3	7.1	6.2	6.3	6.2	5.8	8.7	8.1	12.0	7.6	10.2	170
contremaître-sse	2.1	0.4	1.6	0.9	0.0	0.6	7.8	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	1.9	0.5	0.8	2.2	0.3	1.5	25
employé-e non qualifié-e	14.7	23.5	17.2	9.5	11.4	10.4	17.6	5.3	14.3	11.5	0.0	10.0	13.5	25.6	23.2	13.9	22.2	17.1	285
empl. qualifié-e, cadre moyen	10.9	5.6	9.4	0.9	4.5	1.8	5.9	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	17.3	12.1	13.1	8.5	8.3	8.2	137
employé-e, cadre supérieur	5.0	1.7	4.0	0.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	13.5	3.4	5.4	3.9	2.2	3.3	55
indépendant-e	11.8	5.6	10.0	0.9	0.0	0.6	7.8	0.0	5.7	2.7	0.0	2.3	23.1	13.5	15.4	9.8	8.0	8.9	149
écolier/ère, étudiant-e	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	2.0	21.1	7.1	26.5	37.5	28.5	0.0	2.4	1.9	3.6	3.4	3.5	58
autre statut	0.9	0.9	0.9	0.9	0.0	0.6	2.0	0.0	1.4	0.9	6.3	1.5	1.9	2.4	2.3	1.1	1.4	1.1	19
N**	585	234	819	116	44	163	51	19	70	113	16	130	52	207	259	1'039	591	1'667	1'667
données manquantes	756	341	1'097	116	24	144	59	23	82	202	51	255	105	339	444	1'410	912	2'348	2'348
Revenu mensuel net*																			
aucun revenu	19.6	30.4	22.3	20.9	39.1	25.6	31.0	0.0	23.7	41.0	60.0	43.5	0.0	17.4	14.5	23.4	29.6	25.1	222
moins de 1000 fr.	3.8	4.3	3.9	10.4	0.0	7.8	10.3	22.2	13.2	28.0	20.0	27.0	11.1	4.3	5.5	8.6	5.3	7.7	68
de 1001 à 2000 fr.	7.9	8.7	8.1	23.9	17.4	22.2	3.4	44.4	13.2	11.0	6.7	10.4	11.1	19.6	18.2	9.4	12.8	10.3	91
de 2001 à 3000 fr.	12.3	25.2	15.5	16.4	30.4	20.0	17.2	11.1	15.8	2.0	6.7	2.6	0.0	21.7	18.2	10.8	23.5	14.3	126
de 3001 à 4000 fr.	11.1	13.0	11.6	14.9	13.0	14.4	20.7	22.2	21.1	10.0	0.0	8.7	11.1	15.2	14.5	12.8	13.2	12.9	114
de 4001 à 5000 fr.	18.1	7.8	15.5	7.5	0.0	5.6	10.3	0.0	7.9	6.0	6.7	6.1	22.2	8.7	10.9	16.1	7.4	13.7	121
de 5001 à 6000 fr.	14.0	6.1	12.0	3.0	0.0	2.2	6.9	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	22.2	6.5	9.1	9.4	4.5	8.0	71
de 6001 à 8000 fr.	10.2	2.6	8.3	1.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	11.1	6.5	7.3	7.3	2.9	6.1	54
de 8001 à 10 000 fr.	2.3	0.9	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	1.4	0.4	1.1	10
de 10 001 à 15 000 fr.	0.3	0.9	0.4	1.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	1.8	0.5	0.4	0.5	4
plus de 15 000 fr.	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	2
N**	342	115	457	67	23	90	29	9	38	100	15	115	9	46	55	640	243	883	883
données manquantes	999	460	1'459	165	45	217	81	33	114	215	52	270	148	500	648	1'809	1'260	3'132	3'132

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T28a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2006)

Raison principale*	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
fin régulière sans transfert	42.0	40.0	41.4	22.4	17.6	21.5	29.4	28.6	29.1	62.6	64.2	62.9	65.4	62.1	62.9	43.8	48.9	45.5	1'806
fin régulière avec transfert	5.3	8.6	6.3	14.9	23.5	17.8	10.1	16.7	11.9	2.6	6.0	3.1	1.9	3.5	3.1	6.0	7.3	6.8	271
changement de domicile	4.1	2.3	3.6	9.6	10.3	9.6	6.4	7.1	6.6	2.9	0.0	2.3	0.0	1.5	1.1	4.1	2.4	3.5	137
hospitalisation	1.1	1.6	1.2	0.9	0.0	0.7	1.8	0.0	1.3	0.6	0.0	0.5	0.0	0.4	0.3	0.9	0.9	0.9	35
détention	0.2	0.0	0.1	5.3	1.5	4.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	0.5	18
perte de contact	27.7	26.4	27.3	30.3	27.9	29.0	32.1	35.7	33.1	17.9	17.9	17.8	19.9	19.7	19.7	26.3	23.7	25.2	1'001
rupture explicite	14.2	16.1	14.7	11.8	14.7	12.2	14.7	9.5	13.2	9.9	10.4	10.2	7.1	6.4	6.6	12.6	11.4	12.0	477
décès	2.0	1.4	1.9	1.8	1.5	2.0	2.8	0.0	2.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.2	0.1	2.0	0.9	1.7	66
autre raison	3.5	3.6	3.5	3.1	2.9	3.0	2.8	2.4	2.6	2.6	1.5	2.3	5.8	6.3	6.1	3.6	4.4	3.9	154
N**	1'327	560	1'887	228	68	303	109	42	151	313	67	383	156	544	700	2'422	1'480	3'965	3'965
données manquantes	14	15	29	4	0	4	1	0	1	2	0	2	1	2	3	27	23	50	50

T28b Destination des transferts, selon le problème principal¹ et chez les proches (2006)

Destination des transferts***	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Proches			Toutes sorties			
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
traitement résidentiel	40.7	43.6	41.9	36.7	23.1	29.8	33.3	42.9	37.5	12.5	0.0	9.1	50.0	7.7	13.3	37.8	27.9	32.7	71
prise en charge ambulatoire	50.0	41.0	46.2	46.7	53.8	53.2	44.4	57.1	50.0	75.0	100.0	81.8	50.0	53.8	53.3	48.7	53.5	52.5	114
appartement protégé	3.7	5.1	4.3	3.3	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.3	2.3	5
autre institution spécialisée	5.6	10.3	7.5	13.3	23.1	14.9	22.2	0.0	12.5	12.5	0.0	9.1	0.0	38.5	33.3	10.9	16.3	12.4	27
N**	54	39	93	30	13	47	9	7	16	8	3	11	2	13	15	119	86	217	217
données manquantes	16	9	25	4	3	7	2	0	2	0	1	1	1	6	7	27	22	54	54

T28c Cause de décès, selon le problème principal¹ et chez les proches (2006)

Cause de décès****	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Proches			Toutes sorties			
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
suicide	17.6	28.6	20.8	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	30.0	23.8	10
accident	0.0	14.3	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	4.8	2
maladie	58.8	42.9	54.2	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	40.0	47.6	20
surdose ou intoxication aiguë	17.6	0.0	12.5	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	0.0	16.7	7
autre cause de décès	5.9	14.3	8.3	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	10.0	7.1	3
N**	17	7	24	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	32	10	42	42
données manquantes	10	1	11	1	1	3	0	0	0	1	0	1	0	1	1	16	3	24	24

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s transféré-e-s. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s décédé-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T29 Durée de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2006)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
Durée de la prise en charge* (%)																			
1 semaine ou moins	7.4	10.3	8.3	6.0	9.0	6.5	4.5	7.1	5.3	5.1	6.0	5.5	24.8	16.8	18.6	8.8	12.6	10.2	374
> 1 semaine à 1 mois	4.9	7.9	5.8	3.9	3.0	3.6	7.3	14.3	9.2	10.5	14.9	11.2	11.5	6.4	7.5	6.2	7.8	6.8	250
> 1 à 2 mois	6.0	7.3	6.4	6.0	6.0	6.2	1.8	7.1	3.3	11.5	11.9	11.5	8.3	5.5	6.1	6.8	6.7	6.8	248
>2 à 3 mois	5.6	5.4	5.5	6.0	1.5	4.9	5.5	9.5	6.6	4.8	9.0	5.5	4.5	4.0	4.1	5.5	5.6	5.5	202
>3 à 6 mois	13.2	14.3	13.6	11.6	6.0	10.1	14.5	9.5	13.2	14.3	10.4	13.8	11.5	16.5	15.4	13.2	14.5	13.7	500
>6 mois à 1 an	25.8	26.2	25.9	25.4	35.8	28.1	30.9	26.2	29.6	32.2	38.8	33.1	24.2	32.4	30.6	26.8	29.3	27.7	1'014
>1 à 2 ans	20.8	17.1	19.7	23.3	20.9	22.9	21.8	11.9	19.1	16.2	7.5	14.8	9.6	13.6	12.7	19.3	15.1	17.7	648
>2 à 3 ans	9.9	6.3	8.8	9.5	9.0	9.2	12.7	9.5	11.8	4.8	1.5	4.2	3.8	2.9	3.1	8.5	5.0	7.1	261
>3 à 5 ans	4.2	3.1	3.9	3.4	6.0	4.2	0.9	2.4	1.3	0.6	0.0	0.5	1.3	0.7	0.9	3.0	2.0	2.7	98
>5 à 10 ans	1.7	1.6	1.7	4.7	3.0	4.2	0.0	2.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1	1.0	1.5	1.3	1.4	53
plus de 10 ans	0.6	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	10
N**	1'339	572	1'911	232	67	306	110	42	152	314	67	384	157	546	703	2'263	1'382	3'658	3'658
<i>données manquantes</i>	2	3	5	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	186	121	357	357
Durée (en semaines)																			
moyenne	58.1	48.1	55.1	63.8	62.4	63.5	48.9	44.1	47.6	35.3	24.7	33.5	27.1	33.2	31.9	51.3	40.6	47.3	
écart-type	80.4	75.3	79.0	76.6	68.8	74.4	41.9	59.6	47.3	34.6	23.5	33.2	41.4	46.3	45.3	70.6	61.0	67.3	
1er quartile	13.0	8.0	11.7	14.4	23.9	15.0	20.7	5.9	13.3	6.6	4.9	6.1	1.3	5.0	3.9	10.3	6.9	9.0	
valeur médiane	35.1	27.9	33.1	42.6	39.3	42.1	37.6	26.6	35.0	27.3	18.9	26.6	13.1	24.7	23.0	31.1	26.1	28.9	
3e quartile	74.6	58.8	69.4	83.9	78.7	82.1	64.6	54.0	63.8	48.3	37.6	45.5	32.3	41.9	39.9	65.0	49.7	58.4	
N**	1'339	572	1'911	232	67	306	110	42	152	314	67	384	157	546	703	2'263	1'382	3'658	
<i>données manquantes</i>	2	3	5	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	186	121	357	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T30 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2006)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Substitution pendant la prise en charge*																
non	97.4	98.0	97.5	44.3	34.4	41.6	86.7	83.3	85.7	99.3	100.0	99.4	90.4	90.3	90.2	2'208
oui	2.6	2.0	2.5	55.7	65.6	58.4	13.3	16.7	14.3	0.7	0.0	0.6	9.6	9.7	9.8	239
N**	982	401	1'383	183	61	245	83	36	119	271	55	326	1'755	689	2'447	2'447
données manquantes	357	174	531	48	7	61	27	6	33	41	10	54	519	225	800	800
Type de substitution***																
héroïne	0.0	0.0	0.0	3.0	2.6	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.5	1.7	4
méthadone	47.8	50.0	48.4	91.1	97.4	92.9	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	84.2	90.9	85.9	201
autres opiacés	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.0	7
autres substances	52.2	50.0	51.6	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	7.6	9.4	22
N**	23	8	31	101	39	141	11	6	17	2	0	2	165	66	234	234
données manquantes	3	0	3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	4	1	5	5
Substitution après la prise en charge*																
non	98.9	100.0	99.2	65.6	58.3	63.9	93.1	85.7	91.3	99.2	100.0	99.4	95.3	96.1	95.5	2'210
oui	1.1	0.0	0.8	34.4	41.7	36.1	6.9	14.3	8.7	0.8	0.0	0.6	4.7	3.9	4.5	103
N**	941	386	1'327	157	48	205	87	28	115	259	55	314	1'673	640	2'313	2'313
données manquantes	398	189	587	74	20	101	23	14	37	53	10	66	601	274	934	934
Type de substitution***																
prescription d'héroïne	20.0	0.0	20.0	7.4	5.0	6.8	16.7	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.3	4.0	8.7	9
traitement de substitution	80.0	0.0	80.0	92.6	95.0	93.2	83.3	100.0	90.0	100.0	0.0	100.0	89.7	96.0	91.3	94
N**	10	0	10	54	20	74	6	4	10	2	0	2	78	25	103	103
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s substitué-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T31 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2006)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Postcure prévue et mise en place*																
non	83.9	81.0	83.1	72.9	62.8	70.5	72.5	65.0	70.8	87.3	86.7	87.2	82.9	79.6	82.0	1'548
oui	16.1	19.0	16.9	27.1	37.2	29.5	27.5	35.0	29.2	12.7	13.3	12.8	17.1	20.4	18.0	340
N**	820	315	1'135	140	43	183	69	20	89	181	30	211	1'388	500	1'888	1'888
<i>données manquantes</i>	519	260	779	91	25	123	41	22	63	131	35	169	886	414	1'359	1'359
Type de la postcure prévue***																
appartement protégé de l'institution	0.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	1
service de postcure de l'institution	3.5	0.0	2.4	5.7	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	3.7	3.8	0.0	2.6	8
appartement protégé extérieur	6.2	7.4	6.6	5.7	7.1	6.1	5.9	0.0	4.2	4.3	0.0	3.7	5.6	5.4	5.6	17
service de postcure extérieur	13.3	18.5	15.0	20.0	0.0	14.3	17.6	28.6	20.8	13.0	0.0	11.1	13.1	15.1	13.7	42
centre de consultation pour problèmes liés à l'alcool	18.6	11.1	16.2	2.9	0.0	2.0	5.9	42.9	16.7	13.0	25.0	14.8	14.6	11.8	13.7	42
centre de consultation pour problèmes liés aux drogues	2.7	1.9	2.4	20.0	50.0	28.6	23.5	28.6	25.0	13.0	0.0	11.1	8.5	10.8	9.2	28
autre centre de consultation	17.7	3.7	13.2	20.0	28.6	22.4	17.6	0.0	12.5	21.7	25.0	22.2	18.3	9.7	15.7	48
groupe d'entraide	8.0	9.3	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	3.7	5.2	6.5	5.6	17
groupe d'ancien-ne-s client-e-s de l'institution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
autre	33.6	48.1	38.3	34.3	28.6	32.7	35.3	14.3	29.2	30.4	25.0	29.6	35.7	45.2	38.6	118
N**	113	54	167	35	14	49	17	7	24	23	4	27	213	93	306	306
<i>données manquantes</i>	19	6	25	3	2	5	2	0	2	0	0	0	25	9	34	34

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s pour lesquels une postcure est prévue. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles)

T32 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2006)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Problèmes addictifs*																
alcool	62.1	68.7	64.0	15.2	24.4	17.3	20.3	25.0	21.4	12.0	5.0	10.9	44.0	51.8	46.1	953
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.1	0.3	0.2	6.0	8.9	6.6	5.4	12.5	7.1	0.4	0.0	0.4	1.0	1.6	1.2	24
héroïne	1.0	0.9	0.9	46.4	55.6	48.5	9.5	20.8	12.2	0.4	0.0	0.4	7.3	7.0	7.3	150
méthadone	1.0	0.9	0.9	25.8	31.1	27.0	6.8	4.2	6.1	0.4	0.0	0.4	3.8	3.7	3.8	78
autres opiacés	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	1
cocaïne	2.3	1.8	2.1	14.6	35.6	19.4	52.7	58.3	54.1	4.9	0.0	4.2	7.0	6.9	7.0	144
crack, freebase	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
amphétamines	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.4	12.5	4.1	0.4	0.0	0.4	0.3	0.5	0.4	8
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	8.3	2.0	1.3	2.5	1.5	0.6	0.5	0.6	12
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
barbituriques	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	2
benzodizépines	1.8	3.2	2.2	11.9	26.7	15.3	4.1	4.2	4.1	0.4	0.0	0.4	3.1	6.5	4.0	83
autres somnifères et tranquillisants	0.0	1.2	0.3	2.6	6.7	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	0.8	16
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	1.0	2.7	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.2	4
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.1	3
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	1.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
cannabis	4.3	3.5	4.1	12.6	13.3	12.8	14.9	20.8	16.3	56.9	35.0	53.6	14.2	7.9	12.4	257
tabac	17.3	16.1	17.0	19.2	24.4	20.4	12.2	12.5	12.2	10.7	10.0	10.6	16.3	16.7	16.4	339
autres substances	0.6	0.3	0.5	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	0.7	1.1	0.8	16
jeu pathologique	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.4	1.0	20
troubles alimentaires	0.0	1.2	0.3	0.0	2.2	0.5	0.0	4.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.3	1.0	20
autres troubles assimilable à une addiction	0.0	0.3	0.1	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	2.5	0.8	0.4	0.4	0.4	8
aucun	33.7	30.1	32.7	24.5	26.7	25.0	25.7	16.7	23.5	36.0	57.5	39.2	32.3	31.3	32.0	662
N**	836	342	1'178	151	45	196	74	24	98	225	40	265	1'497	569	2'066	2'066
<i>données manquantes</i>	503	233	736	80	23	110	36	18	54	87	25	115	777	345	1'181	1'181

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T33 Fréquence des rechutes, substance ou comportement impliqué et durée des rechutes pendant la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2006)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Fréquence des rechutes*																
aucune	58.2	46.5	55.0	28.2	22.6	26.7	35.1	28.6	34.1	66.7	76.5	68.0	53.9	42.1	50.6	623
une fois	9.9	8.8	9.6	12.9	9.7	12.1	16.2	14.3	15.9	5.7	17.6	7.4	9.4	11.3	9.8	121
deux fois	7.5	11.2	8.5	16.5	6.5	13.8	13.5	14.3	13.6	2.9	0.0	2.5	8.2	9.8	8.8	108
trois ou quatre fois	11.8	13.0	12.2	12.9	19.4	14.7	10.8	0.0	9.1	10.5	5.9	9.8	12.1	14.0	12.6	155
cinq fois ou plus	12.5	20.5	14.7	29.4	41.9	32.8	24.3	42.9	27.3	14.3	0.0	12.3	16.4	22.9	18.3	225
N**	558	215	773	85	31	116	37	7	44	105	17	122	898	328	1'232	1'232
<i>données manquantes</i>	781	360	1'141	146	37	190	73	35	108	207	48	258	1'376	586	2'015	2'015
Substance/comportement addictif lors des rechutes***																
alcool	96.4	98.2	97.0	14.3	34.8	20.3	33.3	40.0	34.6	17.1	0.0	15.8	70.1	79.2	72.9	415
coktails (héroïne et cocaïne)	0.0	0.0	0.0	3.6	8.7	5.1	4.8	0.0	3.8	2.9	0.0	2.6	1.0	2.2	1.4	8
opiacés	3.2	1.8	2.7	71.4	78.3	73.4	28.6	40.0	30.8	0.0	0.0	0.0	16.6	16.3	16.5	94
cacaïne et dérivés	2.3	3.7	2.7	26.8	47.8	32.9	71.4	100.0	76.9	8.6	0.0	7.9	11.8	14.0	12.5	71
stimulants	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.3	4.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	4
médicaments	3.6	5.5	4.3	19.6	34.8	24.1	19.0	20.0	19.2	0.0	0.0	0.0	7.4	11.8	8.8	50
hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	1.8	4.3	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.4	2
cannabis	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1
tabac	3.2	1.8	2.7	14.3	26.1	17.7	9.5	0.0	7.7	97.1	100.0	97.4	14.1	6.2	11.6	66
substances volatiles	5.0	2.8	4.3	0.0	8.7	2.5	9.5	0.0	7.7	5.7	0.0	5.3	4.3	5.6	4.7	27
autres substances	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1
jeu pathologique	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.6	1.2	7
troubles alimentaires	0.0	1.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	1.1	6
autres troubles assimilables à une addiction	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	1
N**	220	109	329	56	23	79	21	5	26	35	3	38	391	178	569	569
<i>données manquantes</i>	13	6	19	5	1	6	3	0	3	0	1	1	23	12	40	40
Durée des rechutes****																
1 à 2 jours	32.1	15.9	27.5	52.4	20.0	46.2	50.0	33.3	45.5	44.4	100.0	50.0	36.2	21.9	32.4	77
3 à 6 jours	28.4	36.4	30.7	14.3	20.0	15.4	12.5	33.3	18.2	22.2	0.0	20.0	24.1	31.3	26.1	62
7 à 10 jours	11.9	27.3	16.3	14.3	20.0	15.4	12.5	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	10.9	21.9	13.9	33
>10 jours à 2 semaines	7.3	6.8	7.2	4.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	4.7	5.9	14
>2 à 4 semaines	12.8	6.8	11.1	4.8	0.0	3.8	12.5	0.0	9.1	11.1	0.0	10.0	11.5	7.8	10.5	25
>4 à 6 semaines	2.8	4.5	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	10.0	2.9	3.1	2.9	7
>6 à 8 semaines	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.4	1
>2 mois	3.7	2.3	3.3	9.5	40.0	15.4	12.5	33.3	18.2	11.1	0.0	10.0	7.5	9.4	8.0	19
N**	109	44	153	21	5	26	8	3	11	9	1	10	174	64	238	238
<i>données manquantes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une ou plusieurs rechutes. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une ou plusieurs rechutes. Pourcentages par colonne, une seule catégorie possible

T34 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal¹ (selement patient-e-s) (2006)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence de la consommation de tabac*																
jamais	31.1	37.4	32.8	2.7	7.7	4.0	11.8	25.0	14.3	13.4	8.3	12.8	24.8	33.7	27.1	261
1 jour par semaine ou moins	0.9	1.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.1	0.7	1.2	0.8	8
2 à 3 jours par semaine	2.1	1.8	2.0	1.4	0.0	1.0	2.9	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	1.7	1.2	1.6	15
4 à 6 jours par semaine	1.2	0.0	0.8	1.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.1	1.5	0.4	1.2	12
une fois par jour	1.2	1.2	1.2	2.7	3.8	3.0	0.0	0.0	0.0	3.7	8.3	4.3	1.5	1.6	1.6	15
plusieurs fois par jour	63.6	58.3	62.1	91.9	88.5	91.0	85.3	75.0	83.3	79.3	83.3	79.8	69.8	61.9	67.7	652
N**	428	163	591	74	26	100	34	8	42	82	12	94	711	252	963	963
<i>données manquantes</i>	911	412	1'323	157	42	206	76	34	110	230	53	286	1'563	662	2'284	2'284
Nombre de cigarettes par jour***																
0 à 10 cigarettes par jour	14.1	20.3	15.6	11.4	28.6	15.5	21.1	0.0	18.2	36.6	66.7	38.6	15.7	24.0	17.5	81
11 à 20 cigarettes par jour	41.8	27.5	38.3	43.2	35.7	41.4	52.6	33.3	50.0	48.8	0.0	45.5	43.4	27.0	39.9	185
21 à 30 cigarettes par jour	28.6	36.2	30.5	40.9	21.4	36.2	15.8	66.7	22.7	14.6	33.3	15.9	29.7	33.0	30.4	141
31 cigarettes par jour ou plus	15.5	15.9	15.6	4.5	14.3	6.9	10.5	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	11.3	16.0	12.3	57
N**	213	69	282	44	14	58	19	3	22	41	3	44	364	100	464	464
<i>données manquantes</i>	82	33	115	28	10	38	11	3	14	30	8	38	171	67	238	238

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T35 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème¹ (seulement patient-e-s) (2006)

	Patient-e-s: principale substance posant problème ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Objectif de consommation*																
abstinence définitive	38.5	36.4	37.9	71.4	64.9	69.3	72.7	53.8	69.6	34.2	56.0	37.1	43.9	42.5	43.8	708
abstinence limitée dans le temps	14.1	14.2	14.2	3.6	2.7	3.3	4.5	7.7	5.1	7.4	12.0	8.0	11.6	11.7	11.4	185
consommation contrôlée	33.2	38.7	34.7	9.8	10.8	10.7	6.1	7.7	6.3	36.2	32.0	36.0	28.9	32.3	29.5	477
aucune limitation envisagée	4.5	2.3	3.9	2.7	8.1	4.0	1.5	7.7	2.5	8.1	0.0	6.9	4.8	3.9	4.6	74
pas déterminé pour l'instant	8.8	8.0	8.6	10.7	13.5	11.3	12.1	23.1	13.9	13.4	0.0	11.4	9.6	8.8	9.7	157
autre	0.9	0.4	0.7	1.8	0.0	1.3	3.0	0.0	2.5	0.7	0.0	0.6	1.2	0.7	1.1	17
N**	693	261	954	112	37	150	66	13	79	149	25	175	1'170	409	1'618	1'618
<i>données manquantes</i>	646	314	960	119	31	156	44	29	73	163	40	205	1'104	505	1'629	1'629
Pronostic*																
très bon pronostic	10.2	12.0	10.7	7.4	8.9	7.8	5.4	10.5	6.7	11.7	26.1	13.6	10.4	13.2	11.1	188
bon pronostic	45.7	39.4	44.0	34.7	20.0	30.7	42.9	15.8	36.0	52.6	56.5	53.1	45.4	36.6	43.1	728
plutôt mauvais pronostic	30.2	39.1	32.7	43.8	46.7	44.6	42.9	47.4	44.0	29.2	13.0	27.1	31.7	37.7	33.3	563
mauvais pronostic	13.9	9.5	12.7	14.0	24.4	16.9	8.9	26.3	13.3	6.5	4.3	6.2	12.6	12.4	12.5	212
N**	748	284	1'032	121	45	166	56	19	75	154	23	177	1'234	453	1'691	1'691
<i>données manquantes</i>	591	291	882	110	23	140	54	23	77	158	42	203	1'040	461	1'556	1'556

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu